0



J. G. Booth & Co.

HAMBURG.



der



ZEGELEN

Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

Die Preise find in Mart (#) und Schilling (3) Courant. 1 # hat 16 B.
Der Louis: ober Friedricheb'or = 14 % ober 224 &

"Hollandische Ducaten 8 K ober 128 A
"Hollandische Ducaten 21/2 K ober 40 B
1 K ober 16 BMedsenburger neu Courant 14 A

Der Rž ober β nach dem 18 β fuse = 31β

" Gulden nach dem 20 β fuse = 27 β

" Gulden nach dem 24 β fuse = 22 β

" Kubel B A. = 2½, & ober 12 β

" Eilber-Andel = 2½, & ober 42 β

Mit Ansinahme berer, die uns bereits als redliche Begabler befannt find, habt wir die Bite zu mehen, gefällige Auftrage mit Rimeffen ober wenigstens hintanglich Nachweitung zu begleiten. Bur Emballage und Koften, welche bei Bervaalung answartsgehenber Sach erforberlich jinde, wird eine möglicht billige Bergatung angerechnet. Briefe und Gescherche franco erbeten.

on the control of the	D	Gemufe: und Garten	ıf	am	ien.
Ruchenfrauter. goth Pf	und [	Minmanfohl Both !	Pf	unb	Rohlrabi über ber
A STATE OF THE STA	10 A 20 B	A county and the state of the s	- 44	S211/2/201	Mittelfrüher, weißer englischer
igetica	6 9	dorgünlich großer, allerbeiter istater, eetra	14	2007E	Ertra feiner weißer, wiener Glas :
1 - 2 2	21/9	- cyprifder bo. 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	1.59	.igna).	Großer, früher, blauer, engl. Glas- gewöhnlicher blauer
is	8	liefert wirflich schone Ropfe 8	12	-	
3) State of Familiar & Rortion 4 /3 28   -	-	B J war to G Control library shirt one			Reuer artischodenblattriger
1 -	12		30 £	الانساد	Steckrüben ober Roblri
- große duntetrothe	12	Muertinsbeter Juder ober engl. Manivusfohl (belicat) 4 — engl. Lewisham — Peacock's Juvery Brüher engl. Borf ober Grigifohl . 4 — langer Anderbut , der gartefte u. delicatefte Beistohl 4 engliffer Sumeroy's	6	3 -	oder Kohlrabi in der Er
	8	Früher engl. Ports oder Spissohl	13 RA	1 100	Borguglich große, gelbe, rothfopfige, bie bei 15 Bfund ichwere Ruben bringen fam
Asold droof of stide work action by the 2 1 42		Langer Buderhut -, ber gartefte u. belicatefte Beiftohl 4	1	3 —	
to the test of the second seco	8	Reuer englischer Wellington-	1-	 3 9	
managed (1)	- 6	- Imperial 8	018.1		fcwer geworden find. (Siebe Abthei Reue, fehr glatte, feite, große, gelbe, rol
ill 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1	6	langer Buterhut , ber zarteite n. belicateite Weifstobl 4 Rener englitiger Americes	oli v	3 -	Große gewohnliche gelbe
	V (08)	hollandischer 2		2 4	Gewöhnliche weiße
füßer bolognefer (bie Wurgein bavon find gum Det	2 -	fpiger windelfteiner ober winningstädter 2	5 (S)	3 — 1 8	Ruben.
	- 8	platter, fester, mittelgroßer, deutscher 2	1	1 8	Fruhefie weiße, platte Dai
job. erbel, gewöhnlicher 1 - fraufer Plumager 1 - großer spanischer 3 großer spanischer 3	- 10 4 8	Portion 8 & —	-	971170	Reue, fehr fruhe, weiße Schneeball : Belbe, runbe, wilhelmsburger herbit :
	2 -	Nother Kopffohl.			Beiße, runde, Herbit
derbelrübe, delicat	1 4	Ertra fcmargrother, festföpfiger (ber beste Rothfoh)	1	4 8	Ploine meine, martitche, gant edt
	6 — 2 8	Grtra schwarzrother, festköpfiger (der bette Rotspont)			Chte, fleine, teltower
	2 8			3	- rothfopinge.
ipflod	2 8	Cavoner Robl.	101		Runde, schwarze Herbit, belieat
	5 -	Chan fuither flainer orter france Wirling 3	25 1363	3 12	Rerhelruhe, Delical
Walne frauchlättrige, jur Bergierung 4   -	7 (12) T (TT)	Mittelfrüher — 2 Großer, später, frauser Wirfing 2	-00	3 - 8	Aufferdem noch 26 Sorten große englische und ber 7ten Abtheilung aufgeführt.
Meliffe, Bitron - 4	5 8 3 <del>-</del>		230.		Artitle Calebratica and States
Beterfile, schriebe Schnitts ober Krauts 1	- 8	Drumhead Savoy, ertra Imone Sorte. 3		4 8 3 -	Runfelrübe
Beterfilie, ichlichte Schutter voor Actual - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	- 12 3 12	Reuer, gang fleiner, merkwürdig geschligtblattriger, febr gart und belicat			Borzüglich große röthliche, beste Sorte
- breifach gefultbiatrige, gut Seigereng 2	2 -	fehr gart und belicat Bortion 6 3 -			- gelbe Borgüglich große gelbe Buder-
Reterfilienwurzel, große, glatte, barbowifer	- 10 - 12	Nofentohl.	100		Mans meine, echte Buder =
große Juster .  Bieffer, spanischer, 1) mit langer, rother Frucht .  2) mit großer, bidre Frucht, 3) liebesapfel- früchtiger, 4) gelber, 5) violetter und 6) strichformiger. a Bortion 2/2 24	8 -	Bruffeler Sproffen : ob. Rofen: Birfing, vorzugl. fcone Corte	3	3 8	Die Preife ber Runkelruben find für größere (Futter-Runkelruben fiebe unter Abtheilu
2) mit großer, bicker Frucht, 3) liebesapfel-		Diefer bringt rings um ben Stamm leine Sproffentopfden,	300 0		Wurgeln ober Di
6) firschförmiger à Bortion 2 /3 24	(05)	Diefer bringt rings um den Stamm keine Sproffenköpfchen, die ein belicates herbit- und Wintergemuse abgeben.	9 1		Gang fruhe, furge, rothe Carotte gum Er
Pimpernell 1	- 12 3 -	ORI Settan Political Control and	0 1		Dedaleichen aant felne, ausgezeichnet ich
Bimpernell 2 Porro, gewöhnlicher, bider Winter 2 — Winter , gang besonbers großer, bider, brabanter 3	4 8	Mittelhober, ertre frauler, bunklgrüner, febr gefüllt.  hellgrüner, breitklättiger, deinburger, mit febr frauler Einfassung noch garter als verstehen Niedriger, Iranier, grüner Kausfer, niedriger, bunklerauner Bober Braunfold.  — gang vorgüglich schoner versigscherdter, Bertion 8,62  — Ghnitts oder Krihlingsfohl.  — Wieder, um die Witte Zull die Witte August auf Beete gesiet,	1	1 4	Solland. furge bouwifer, gum Treiben Altringhams, neue fuße, die vorzüglichfte,
arater identitider		bellgruner, breitblattriger, ebinburger, mit fehr	Title 1	Another .	ichmedenb, fehr zu empfehlen; fie loderen Bobens, wo fie mehrere M
	3 -	ber, fehr zu empfehlen	1	1 8	Reine gans meine Murgel, febr tub; e
- bider, turger, rouen ichet 2 - Sommer: ober frangöfischet 2	2 8	Riedriger, frauser, gruner	1 1	1 -	Bene, febr große, weiße, gruntopfige
Borinlaf, gelber 2  grüner grüner 2	2 4	- hoher Braunfohl.	1	1 8	Meue, fehr große, weiße, grunföpfige Lange, rothe engl. Burzel oder Möhre
		Bunter Plumage: oder Bedertohl	2	Steins	Lange, rothe barbowifer
Raute ober Beinraute. 2	3 —	rothgeschedter, — 8 "	1	1 4	Reue, violette
Rosmarin 3 Salbei. 2	2 -	Diefer, um die Mitte Juli bis Mitte August auf Beete gesäet, liefert im nächsen Frühjahr einen angenehmen jungen Kohl.	701		Bucker-Beterfilienwurzel
Samman orten großblattriger Garten : 2	2 -	liefert im nachten Frunjahr einen ungenehmen jungen Roht.		2 -	- Fleine ichwarzrothe, ertra
a w 1 6 2 Marie anglian histor Quallan-	2 -	Desgleichen mit Blumentopistatt Gelfer garter Bmiterfohl.  Tausendföpfiger Kohl Blauer Richenfohl, 7 — 8 Hus höch Worder Baum oder Kuh Köhl.  Teuer Balmbaumlohl, fichon	3	3 —	
— vorzüglich größer, glatter leipziger bo. 2 — gewöhnlicher Schnitts 1	2 8 1 8	Blauer Riefentobl, 7 — 8 Tuß boch	6	8 -	- fehr bide, große, bie beft e Scorzioner ober Schwarzwurzel, befte
Francisco ha 2	2 -	Großer Baum: ober Ruh Rohl	6	8 -	Buderwurzel
waifi an adutar analifeher 3	4 8	(Aulletoem noch Irodineten unter moden.	0.0		Scolymus hispanicus, neues Gemufe,
pioletter bo. bo. 3	4 8	Borte guet Traften, tori pron Charles une felir volt.			The County of th
neuer engistate commission	manual.	Brocoli ober Spargelfohl.	-		Cichorienwu
netter engittider Inergi- Die 4 letten Sorten find bie, welche in England unter bem Ramen: "blanching Celery" bekannt, und gebleicht als Galat gegeffen werben. — Gultur-Unweifung bei bem		Die beliebteften englithen Corten.	00		Chte, glatte, große, lange Cichorie
Galat gegeffen werben. — Gultur-Anweisung bei bem		empfohlen, weil er bem, ber mehtee Gorten davon anbaut, vom Frühherbste bis jum folgenden Frühjahre ein belicates	dlr		Radies und I
Senf, brauner hollanbifcher	- 8	Gemufe fichert, wenn namlich w Eintritt bes Froftes bie gangen Stode mit ber Burgel ufenommen, und im Keller	10-7		Robies fruhe meine runbe furalaubige
— gelber bo.	_ 5	ipachien groomin toetter lore manage bert lange grobie.	201		neue, tanglichrunde, rofenrothe, fr trefflich für's Miftbeet
gelber bo befter, reiner, gelber, englischer, befte Sorte gur Magen ftarfung burch Rieberichluden ber Korner -	- 8	Englischer, violetter spater Cape	8	9 — 15 —	- burburrothe, runde Monate:
neuer dineficher, Sinapis pekinensis Bort. 6/3 -		pater .	5	7 -	rofenrothe, runbe bo
<b>Thymian, Winter</b> 2 Sommers 2	3 8		10	14 - 15 -	- vorstehenbe Sorten melirt
Wermuth, echter, Artemisia Absinthium 3	3 -	weißer früher bevonffer	5	6 -	Rettig, großer, ichwarzer, erfurter Winte
Spinat.	Digital	beiger truder devoniter  - ipater teiner Caps 1 - früher alteler 1	10	15 -	
Spinat. Großer, breitblättriger mit runbem Samen	- 6	-   raher altelet   1	10	16 — 16 —	neuer, violetter Binter:
breite und langblättriger mit ichnem Santen beite und biefblattriger 1 breit und langblättriger mit icharfem Samen. 2	= 8	grûner, frûher	6	8 — 15 —	Ropffala
Bundiffer immermahrenber Minter: ober Rumex patientia 2	1 8	- ichineletitetoet	12	20 -	Bericiebene ber beften Gorten melirt, er
Menselandischer (Tetragonia expansa) 2	2 -	fproffender fpater fruben	8	10 - 12 -	Früher holland., bruine geel, auch zum Tre Allergrößter Cyrius-, extra
Diefer febr ichmachafte Spinat hat die gute Eigenschaft, während des heißelten Gommers, wenn der gewohnliche Spinat ganglich mangelt, am üppigsten zu gedeben. Es ist ein sich weit ausbreiteness Gewächs, woonder Same erst in Abpfe	Digett.	neuer verbedter	8	12 - 14 -	Gehr großer engl. Erommelfopfe, gang bi
ganglich mangelt, am uppigften zu georiben. Es it ein na weit ausbreitenbes Gewächs, wovon ber Same erft in Topfe	Page	neuer portomoutot	10	14 -	Bunter Forellen-, giebt fehr icone, feft
Rener falatblåttriger. 6	Paper L	miedriger Imperial	12	16 - 16 -	Blutforellen-, fehr festfopig und ichon
Description Chananadium Onings 2	1	8 — Summer's fpaterifer	12	15 -	Wrüber brauner Steinfopf:, gum Treibe
Gartenmelbe, rothe und weiße jebe 1 1 4	- 1		12	16 -	- griner bo. bo.
(Signature (Marambryanthommen overtall) Rortion 4/5 60	of the second	The state of the s	ggos.	Oroga	Großer blaggelber, englischer Bringenfor - rothfantiger bo.
Wird erft in Miftbeete gefaet, und wenndie jungen Pflanzen zum	Tana en	See- ob Meerfohl.	N ENG	mo Bi	- gelber Prahl :
gepflangt. Die Blatter als Spinat, find delicat.	Truco e	Schottlifter, Crambe maries dugarft beliegt manay sine		70.0	Belber Mogul
Bortulat, gruner und gelber, als Spinat eins ber gefunbeften Gemufe, befonders bei Leberfrantheiten	2	Schottifcher, Crambe marita, außerft belicat, wovon eine Antweifung jur Auftur in Samen beigefügt wirb	2	-040 s	8 Blafgelber Dauer ober Winter

en.	The National
Rohlrabi über der Erde. goth	Pfund A. B
SI S	3 - 4 8
	4 8
Grover, Truper, blauer, engi. State	2 -
- gewöhnlicher blauer 2	201098
Reuer artischodenblattriger	
Steuer artispotentoutingt:  Steuer artispotentoutingt: oder Kohfrabe in der Erde.  Borsäglich gere, gelbe, rokfodynge, die dei gehöriger Kultur 15 Brund ichnere Anden bringen Angelen Stedenübe bringt beindere finden hieben, die hier die 23 Brund ichner genorden ind. (Siehe Achtelium 23 Brund) ichner genorden ind. (Siehe Achtelium 23 Brund) ichner genorden ind. (Siehe Achtelium) Keue, sieh glatte, sieht, große, gelbe, rotsfoppge Laing's, fodin geformt, siehe zu empfehlen Orose genochnisch gelbe	Neut, groß Urine frau
ober Kohlrabi in der Erde.	Oroșe, bri
Borgüglich große, gelbe, rothfopfige, bie bei gegotige	1 4
Reue rothgranhantige, gelbe, engl. Riefen Stellen	Commerci
fcmer geworben find. (Siehe Abtheilung 7.)	2 8
ichon geformt, febr zu empfehlen2	2 8 - 14
Große gewohnliche getor 1	Street souls
Muben. gene deseimene bei	Sange, fing
Trübelte weiße, blatte Wai  Reue, sehr frühe, weiße Schneeball  Reue, sehr frühe, weiße Schneeball  Gelbe, runde, mithelmsburger heröfte  Beiße, runde, Scröft  Gelbe, lange, vobrifelfige  Lange, vobrifelfige  Lange, weiße wärfische aun echt  1	- 12 3 8
Rene, fehr frühe, weiße Schneedall	+ 12 - 12
Beiße, runde, hottfelbiche.	12
Gelbe, lange, bobtfelbiche 1 Kleine, weiße, marfiche, gang echt 1 Chte, fleine, teltower 1	1 4 1 4
Lange, weiße Berbft	(hatal <del>las</del> (k mitha <del>las</del> (k
Sehr lange, bunne, gelbe Ottereberger 2	2 -
Runbe, ichwarze herbit-, belicat	1 2 ml
Chite, fleine, tellower. 1 Lange, weise Grebt 1 Echte lange, binne, gelbe Olteroberger. 2 Rumbe, ichwarze, derbe, belient 2 Riche, feine, gelbe, matelen 2 Rerbefrühe, belient 2 Rerbefrühe, belient 2 Rerbefrühe, belient 2	(II) 2 (FII)
Rechtitute, beiter  Ausgeben noch 28 Gorten große englische und sonstige Rüben unter  ber 7ten Abtheilung aufgesichet.  Munfelermiden.	Lange, gree
Munfelruben.	fonder Eelfr lange
Borzuglich große rothitche, beite Cotte	- 10
— gelbe — — 1	- 8
Bang weiße, echte Buder	5
Bang weiße, echte Zuder: 1 Die Preffe der Kunkelrüben find für größere Quantitäten niedeiger. (Futter-Runkelrüben fiehe unter Abtheilung 7.)	Juni .
Marreln ober Mobren.	ins
Bang fruhe, furge, rothe Carotte gum Treiben 2	1 4
Solland, furze bouwifer, gum Treiben	2 8
Alfringhams, neue fuße, die vorziglichfte, größe mb febr wohlt ichmedend, febr zu empfehlen; fie bedarf eines tiefen, laderen Bobens, wo sie mehrere E schwer werben tann 2 Keinr, gang weiße Murgel, febr füß; eignet sich vortresflich werben ber Schwer von Schwer von Befond, zu empfehlen 2	THE SALES
Weine, gang weiße Burgel, fehr fuß; eignet fich vortrefflich	24 Contan
geme, gang teethe Bottet, fung fang befond, ju empfehlen 2 jum Stoben ober Schmoren; gang befond, ju empfehlen 2	1 8
	1 8
Lange, rothe braunschweiger	
Reterfilienwurzel, lange, glatte barbowifer	- 10
Buder-Beterfilienwurgel Rothe Beet, große febr bunfle	- 10
Flains Schmannathe ortro	- 12   - 8
Baftinat- ober Moorewuzet, lange, gewöhnliche — fehr bicke, große, die beste. Scorzioner ober Schwarzwurzel, beste Sorte	
Buderwurzel	25 110 2 5
Scolymus hispanicus, neues Gemufe, in ber Art von Geors	- THE S
Bioner Murger	हिंदे का रहात्र
Cichorienwurzeln.	
	$\begin{bmatrix} -10 \\ -10 \end{bmatrix}$
Radies und Rettia.	Carton, ob
Radies und Rettig. Radies, frühe, weiße, runde, furzlaubige Monats	1 1 4
reue, langlichrunde, rotenrothe, fruhe, turgiauoige, vor	3 4 -
- purpurrothe, runde Monats-	1 1 1 4
- frühe, rosenrothe, lange Glas :	1 1 6
00.44:	2 2 -
— melger — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1 1 4
- mittelgroßer, gelber Sommer: - neuer, violetter Binter:	2 -
Comment belowing to the second to the second	
Berfsiedene ber besten Sorten meller, ertra Frühe holland, kenine geel, anch zum Treiben, sehr zu empfehlen Allengrößter Cyriune, ertra Sehr großer engl. Trommelfopfe, gang vorzäglich	2 3 8 4 8
Allergrößter Cyrius-, ertra	3 4 -
Großer affatischer, allerbefter	3 4 -
Bunter Forellen, giebt febr icone, fene sopfe	3 12
Guirorenen, fest efenosig and jugar Größer bedime Früher beauner Eteinfosf, jum Treiben.  — gefber bo, bo,  — griner bo, bo,	3 3 12 3 12
— gelber bo. bo	3 3 12 3 12
Großer blaggelber, englischer Bringenfopf	3 3 8

Schnitt, ober Stechfalat. 20th	pfunb	Pahl. ober Schalerbien. Pfund	2) Pflanzfartoffeln.
Latuf, gewöhnticher fruber	1 8 1 8	Maierbfe, neue Prince Albert-, fehr fruh	Gine Portion von 4 bis 12 Stud von jeber ber nachflebenben Corten
	- 12 - 10	- fehr fruhe Bettrenner, 3 Jus hoch 8 bie fehr fruhe, wolltragende, englische, bie einige Tage fruher	fostet die einzelne Bortion 4 3. — Sehr viele Sorten fonnen auch ingrößern Duantitäten abgegeben werden, und fosten a Spint von 11 W 10 3.
- gelbe, breitblattrige, englische	1 -	fommt als nachstehende Sorte, 3 bis 4 Fuß hoch 7	1) Das Sortiment der altern Sorten, Ro. 1 bis 40, für 6 &
- perennirende, amerifanische	3 —	bie gewöhnliche frühe, volltragende, 4½ Fuß hoch 6  Bishops-, ift eine ber früheften aller Erbfen, und obgleich	2) Die 1834 aus England und Schottland eingeführten 41 Sorten, Ro. 41 bis 81, für
— ind. Kapuginer, Paan Kreffe und Nasturtium genannt 2 Rabungel ober Feidfrop, großer, breiter	1 4	fie nicht über 1½ Fuß hoch wird, so trägt sie doch sehr voll	3) Die neuesten aus England und Schoffland, Ross bis 165, 200 15.
Cichorie, Forellens ober buntblattrige 2	2 -	Engl. Erbfe, langichotige Cymitar, ift als volltragend und belicat febr gu empfehlen und eignet fich vorzugeweife als Folgeerbfe,	4) Das gange Rartoffel Sortiment, von 150 Sorten, für 2 Stud Frb'or.
Borg, iconer engl. ob. Coss Lettuce, alle Sorten melirt, ertra 4	5 —	пеце, weiße Cymitat 8	1) Sehr frühe, mehlige, englische. 2) Ertra frühe, engl., sogen. Milibeete. 22) Lange, grüngelbe Zwitters. 23) Ertra frühe, ameritanische, behal. 23) Rock 8.
beegleichen brauner, Brown Coss-Lettuce 6 — weißer, White do. 6	8 -	grunbleibende Imperials, eine fcone Sorte, 3 Fuß hoch 8	4) Allefrühefte, lange Rierens.  5) Frühe, feine Manley's.  25) Biehs oder Tutters, große permias.
- bunter, Spotted of do. 6 - Bath Coss-Lettuce 6	8 — 8 — 8 —	Englische Marferbse, Knight's-Harrow, die hohe; die anerkannt de- licateste Erbse, tonn zu frühen und spaten Aussaaten	6) Lange, eichenblatte. Nierens. nifche. nifche. 26) Desal, ertra große, politragende.
- Cape do. 6	8 — 8 —	benugt werben, 8 bis 9 Fuß hoch 9. neue, verbesserte, frühe Sorte, ertra 10	8) Lange, hellrothe Nierens. weiße, englische. 9) Frühe, hellrothepfälzer. 27) Glücfädter Biehs, große, volltras
Die obigen 7 erprobt. besten Sorten, v. jeder 1 Bortion 1 4	8 —	Knight's-Marrow, die niedrige oder Krup-, im hohen Grade belicate Erbse, ebenfalls eine schone Kolgeerdse,	10) Engl. frühe, meßige Roastboef. 11) Frühe, weiß mit roth, newhorker. 28) Do. do. gelbe: 12) Edte, feine, blaublüh, holl. Winters 29) Extra große, volltragende, mehlige
Romischer Bindsalat, Laitue romaine	3 —	3-4 Tub hoch 10 - grunbleibende Nonpareille Knights Marrow, die hohe,	13) Feine, engl. Spargel.  14) Beine, engl. immeriolitende (Ever- 30) Salfde Arracachas (Arafatfda)
Spargel-Salat.  Lactuca augustana, wovon bie Stengel wie Spargel bereitet		faft noch ichoner als die vorftehende 7-8 guß hoch 12	lasting.) 31) Tannenzapfens. 15) Preis von Westerwald. 32) Frühe bunte.
merben 3	400	drige, extra schon, 3 — 4 Tus hoch 12 Neue englische Victoria 5 Bus hoch 10	16) Engl. runde, rothblau marmorirte, 83) Eerchens. mehlige. 34) Gurtens.
Beet, große bunfelrothe	<b>— 10</b>	Reue graue, mit buntelpurpurnen Schoten	17) Lange besgl. 35) Kleine, feeldabliche. 18) Blane Dorne. 36) Cammete. 19) ChourghlaueBachs od. Kastaniene, 37) Immerehlühende.
- fleine schwarzrothe, ertra 1 -	- 12 - 12	Reue gußerordentlich große, englische Waterloo-, ertra	am besten im April und Mai zu 38) Erdbeers.
gelbe		Reue Royal Adelaide-, ertra	20) Gelbe, tunde. 40) Buders
à cardes blanches)	1 8	Engl. Blaserbfe, nene, große, grünbleibende	Die 1834 aus England u. Schottland eingeführten. 41) Black seedling. 56) Farmer's. 69) Pine Apple (Gnanas.)
	8 - 2 -	— neue, größe, unvergleichsiche	42) Black skinned. 57) Low's early white. 70) Pertshire red. 43) Breadfruit. 58) do. do. red. 71) Posie's.
Endivien.		neue, fruhe, grundlubende	45) Conaught. 59) Lancashire pink. 72) Red rose. 45) Conaught. 60) Late champion. 73) Red rock.
Ertra frause, grune Blumage : ober Feber : 2	2 -	Erbse mit violetter Bluthe 8	44) Douglas. 61) London particular. 74) Ross's early. 47) Dryden's white kidney, 62) London long red kid-75) Ross's pygmae. 48) Early champion. ney. 76; Robertson's red giant
Goldgelbe, schone Malla 22	2 — 2 —	Frühe Folgeerbse, bie gewöhnliche 3-4 Buß hoch 6 Grune Rrub- ober grunbleibende, volltragende Folgeerbse, 3-4 n n 5	49) Early Hopton. 63) London blues. 76) Ködertson's red giant kidney. 50) Early London. 64) Lumpers. 77) Roserther.
Gehr breite, frause, grune frangofische	2 — 4 —	Gold- oder Bachverbfe, die allerspäteste und am geeignetsten jum späten Bflanzen, um noch bis Novbr. junge Erbsen zu haben	51) Early american. 65) Musgrove's snow white 78) Rough black.
Commer-Endivic, Laitue romaine	3 —	7-9 Tuß hoch 8 Sehevolltragende, niedrige, große Rapuzinererbie, ert. fcone Sorte 8	53) Early prolific. 67) Ox noble (Sutterfar: 80) Sanderson's. 54) Early white kidney. toffel). 81) Higston
Bwiebeln ober Zivollen. Große, harte, platte, bunfelrothe hollanbifche. 2	3 8	Rene, zweimal tragende Riefenerbfe, ausgezeichnet in Ertrag u. Gefchmad 10	
gelbe bo 2	2 — 5 —	Kontanellerbse, große, glatte	Die neuesten aus England und Schottland.  89) Albany kidney. 114) Fise white. 143) Painted lady.
	5 —	trodener Erbfen, Die febr ju empfehlen find 4-5 guß 8 Spanische Richer, als trodene Roberbie febr zu empfehlen	90) Bevesford kidney. 115) Falconer's kidney. 145) Purple skinned early. 91) Brown's fancy. 116) Fox's early globe. 146) Irish round pinkeyed.
Rene Riefenamiebel, ertra	8 —	Felberbsen, fiehe Abtheilung 6.	92) Cork red. 117) Fox's early delight. 148) Rafford. 149) Common Yam. 118) Fill-basket. 149) Red American.
in kraftigen Boden verpflanzt, liefert Anfangs August eben fo große Zwiebeln wie die aus Portugal bezogenen.		Buckerenbien.	94) Common frame. 119) Goldfinder. 150) Red bleeaffruit. 197) Orchard. 121) Irish seedling. 152) Rock kidney. 188) Cluster. 122) Imperial kidney. 153) Shetland black.
Binterhollauch (bleibt ben Binter über ftehen und giebt im	4 —	Riefen-Budererbfe, eine neue, vorzüglich schone Sorte, beren Schoten febr fleischig, über 6 Boll lang und 12 30ll breit	99) Daly's wonder. 123) Invermay early. 154) St. Helena.
Ctecfzwiebeln.	z smith.	werden — 5—6 fuß hoch	103) Dod's seedling. 128) Late prolific. 156) Salisbury early. 104) Douglas Irish kidney. 129) Lawhead late red. 157) Stevenson's kidney.
Berllauch (nur vom Juli bis October zu haben)	- 12 - 12	5—6 Fuß hoch 8	100) Dickson's early, 134) Late white American, 160) Stanoid Hall,
	- 12	- fvåte volltragende 25 ,, ,, 10	107) Entire black. 135) Manly. 161) Walls of Great Bri- 108) Early Pale red. 137) Matchless kidney. 162) Williamson's favourite.
Rnoblauchzwiedeln, große Knollen " " 12 " Egyptische Luftzwiedeln " " 12 "	Scanik a	Ungarische, große, spate, schwarzfeimige 6-7 " 6	110) Early field kidney. 139) Allison's kidney. 164) Ploughboy. 111) Early prolific. 140) Flat white. 165) Foxly early.
Gurfenförner.	mbina.	Grunbleibende volltragende Buder, fehr fcon	113) Early seedling. 141) Ashleaved kidney. 86) Die große Rohan'sche, riesenartige.
Sange grine Schlangengurfe night his gemühnliche glatte		Rene, graue Rron-Budererbie, mitgang weißen Schoten 4-5 " 8	87) Irlandische, außerordentlich ergiebige und mehlreiche Ruttoffel,
Sehr lange, glatte, grune Schlangen- 6	9 -	Rosenfarbig blühende Kron-Zuders 4-5 " 8 Spargels ober Blügelerbse 4 " 16	88) Frühreife Sollanbifche Sommer.
Mittellange, grune, gewöhnliche	5 8	Tener, and trains the first the second control of the	166) Frangofifche: "St. Jean de Segonzae", eine fehr große, glatte, weiße, volltragende Kartoffel, fotwohl jum
Ertra fruhe, neue, zum Treiben 16 Rorner fur 6 /3	8 —	Zurfische Stangen-Bohnen und Erbsen. Schlachtichwerdt : Stangenbohne, befonders lange, breite, fleischige,	guttern als zur Brennerei gang besonders zu empfehlen Bortion 8 & 167) Englische Runtelrüben Rartoffel, eine febr
Die mirflich echte engl. Non-plus-ultra ober Prize-fighter	10 810	biefe Sorte liefert 12—14 3oll lange und über 1 3oll breite Schoten 16	große, langliche, in- und auswendig hellrothe, auf gutem Boben febr ergiebige Kartoffel. Ebenfalls zum Futtern
jum Treiben, wird über 2 Suf lang und ift bie mobl-	guina 87	beegleichen zweite Sorte, Schoten 10-11 Boll lang 12	und für die Brennerei
Melonen - und Kantalupenförner.		Orbinaire Stangenbohne ober volltragende Vice-Turfifche Bohne (bient nur zur Erzielung trodener Bohnen)	169) Rother Tannengapfen, febr ergiebige, mehtige Kartoffel " 6 " 170) Zwerg : Treib : Kartoffel, langliche, allerfrühefte,
Melonen und Kantalupen in Sorten nach unferer Bahl 24   - besgleichen, viele ertra Sorten melfrt	1.1	Schmalz- ober Butter-Brechbohne, bidichotige	niedrige und zum Treiben paffenbfte Sorte. Man fann mehrere Male von berfelben Staube ernten, indem man
besgleichen, viele ertra Sorten melirt 12 besgleichen, mehrere gute Sorten melirt 6 Große Wassermelone (Sandia, Angurie, Arbuie) 20	8 -	Berliner Juder-Brechbohne, ertra 14 Reue, rheinische, große, weiße, bidichotige Zuder- Cabel Brechbohne,	von Zeit zu Zeit nur die daran sitzenden größten Kartof- feln, durch forgfältiges Buhlen in der Erde, mit ber Hand
Das nachft. Sortiment v. 40 Sorten (6-12 Rorner von jeber) für 5	X 83	12 Bell lang 16	abnummt, wodurch dann das Fortwachsen nicht gehindert
24 Sorten nach unserer Auswahl 3 12 bo. " " " 1	" 8"	Kleine weiße Perlbohne ober Türkische-Erbse mit Schoten ohne Fasern (sehr zu empfehlen)	171) Allerspäteste feine Lima-Kartossel. — Kruß ges pflanzt seht sie doch erst im Herbste an, und liesert daser am spätesten junge Kartosseln
Ginzelne Bortionen	1000	Gewöhnliche Turfische Erbse ober Berlbohne. 12	am fpatesten junge Kartoffeln
Unanas - Manas . mit rothem Meifche   Maltefer, mit weißem fleifche Grune Ret =	ine	Gang fleine Reis-, Berl- ober Salatbohne 16 Kleine, bunte, englische Salatbohne 12	Salat-Rartoffel ober jum Schmoren ju embfehlen
Melone von Sonfleut Rieintornige Zuder- Schwarze, portugi	efifche Be, duntel	Durchfichtige Bache-Bohne, mit Schoten ohne Fafern, fehr belicat 14	wurdig burch die verschiedenartig. Bildungen ber Knollen, a Stud 4/3 174) Giergelbe Kartoffel von den Cordilleren " 4 "
Ananas, mit rothem Fieldes Mallefer, mit weisem Fielde, was Befone den Honfleur Gründer des Grünem des Grünes des Grü	ertra	Gelbe weißschalige Buder-Brechbohne. 14 Brunt- ober arabische Fenerbohne, große rothblubenbe. 8	- 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
grübe, grüne, javanische mit grünem Fleische amerikanische mit grünem Fleische amerikanische Sperische, schaftliche Bed Water-Melon	the, Apple-	Reue rothbunte bo. fehr hubich	Contemporary contemporary and a state of the
Rantalupen ober gerinnte Melonen.		Brunt, Mandels oder Spectbohne, große, bide, weiße. 10 Ririch Stangenbohne, fleine, rothe, runde. 14	3) Officineller Samen. pfund
Prescott de Patie, ertra.  Schwarze Kameliter Pringen fichen.  Schwarze Kameliter Pringen fichen.  Schwarze Kameliter Pringen fichen.  Schwarze Kameliter Schwarze Ka	uls s	Rrup-Bohnen.	Atropa Belladonna, Zollfirfche Soth 2 - 32
Stange : Schwarze, bollandiche Sehr große, frube, i Giber : Bribe englitche englitche : Rrübe aftrakanische, extra Rock's fumarie : Minter-	Bletfche	Allerfrubefte hollandifche Diftbeet-Rrup-Schwerdtbobne, vorzuglichfte	Anethum Foeniculum 190% 30 — 6 — — dulce 20th — 2 32
Frühe weißgrundige Amerikanische Ananas: Auserbanische Mußerbem noch einige 20 Sorten Melonen u. Kantalupen mit No	amen.	Sorte jum Treiben, niedrig von Buche und fehr vollstragend, fehr zu empfehlen auch fur's freie Land 20	— graveolens 6 Angelica Archangelica 33
Diverse Gemuse. Both	Pfund	Große breite Schlachtschwerdt Krupbohne, ertra 8 Gewöhnliche, weiße Krup- ober Nierenbohne. 6	Anisum vulgare
Diverfe Gemufe. 2018   Metijchode, große violette. 6	7 8	Gewöhnliche, weiße Krup- ober Rierenbohne	Arropa Relladonna, Zolffirf@r   2-ct, 2 -   38   Archilea millefelium   3608, 30 -   6   2-ct, 2 -   38   Anethum Fonciculum   34008, 30 -   6   2-ct, 2 -   38   2-ct, 2 -   38   3-ct, 2 -
neuer, großer, bid ober folibitenglicher. 3	3 — 6 —	Rleine, fruhe, gelbe Rrupbobne, auch gum Treiben	Carum Carvi 100 % 34 — 6 Ceptaurea (Card.) benedicta 24  Cepta
artinjouse geber violette. Garbon, ober [panifder Garbi, gewößnlicher. 3 — neuer, großer, bief ober follöstenglicher. 4 Poirce a cardes blauches over Effectvet 2 Epangt, großer, rosifer, bilder, bie ohe Gorte 2	148	Rleine, frühe, gelbe Brinzeß-Arupbobne 8 Reue, gelbe, fehr frühe Zucker-Arupbobne, auch zum Treiben 12	Chamomilla officinalis 7 12 48 Chelidonium majus 7 4 48
Spargel, großer, weißer, bider, bie beste Sorte 2 - englischer Riefen 8 Rücenfürbie, gewohnlicher großer, biverfe Sorten 2	1 8	Beiße Krupbohne mit rothem Abler. 10	Chenopodium ambrosioides. 12 Cicer arietinum 12 Cochlearia officinalis 40
fleiner amerifanitcher Mart, ober Vegetable	3 —	mit schwarzem Ablet 10 Frühe, schwarze Krupbohne, sehr volltragend. 8	Colchicum autumale, Samen à Et. 12/3, Zwiebeln pr. Duzend
Marrow, als ber feinste zu empfehlen 12	12 —	Und andere Gerten mehr.	Crocus sativus (Safran Croc.) 100 ftarfe Zwiebeth 2 8 Datura Stramonium 20th 4 82
Tomates ober Liebesapfel (gu Saucen). 8	10 —		Dictamus albus " — 8 Digitalis purpurea " — 6
Girepanie, over Herengena (Solianum Melangena). 10 (imie zeistingspielere Ganateu um Brangelen). 8 Tomatea ober Eichesdpiel (im Ganaten). 8 Physalis edulis, cibore. 9 Physalis edulis, cibore. 9 Ribabarber, neiter, milber, englifiger, norriber Ralperes bem		Große Bohnen.	Hyssopus officinalis
Rhabarber, neuer, milber, englischer, worüber Raberes bem Samen beigefügt wirb		Gewöhnliche 4 Gnalische Windsor Beans, vorzüglich große, birect aus England be-	Adjuncţis vingari
neuer Tobolsks 16 neuer Riefens 16	ZZ	8 30gen	Meliotus officinalis 100 8 25 — 5 Melissa officinalis 88
Samen begafügt wird. 16  — neuer Tobolsk: 16  — neuer Stefen: 16  Grömandef, Cyperus esculentus. 100Sind 4/3  Grönuff, Arachis hypogaea. 6 " 12 "  Grönuff, O. Topinambour (Helianth tuberos.) 100 " 2 ½  Degleigen neuer, geiber. a " 4 b	100 12 N	Englische Windsor Beans, hiefige	Mellotrat officinalis
Groapfel ob. Topinambour (Helianth.tuberos.) 100 , 2 // Desgleichen neuer, geiber		Fruhe, fleine, hohe Mazagens 6	Nigella sativa 100@ 36 7 Origanum Majorana 88 Paeonia officinalis 88
Champignonbrut, nebft Angeige, wie Champignons baraus zu erzeugen, die Bortion von 2, 4u. 6 1.		Grunbleibende, große bo	Paeonia officinalis Papaver somniferum 6 Phellandrium aquaticum.
	54	gen von Gemufebeeten ic anwendbar) 8	Plantago Psyllium 13 Rubia tinctorum 33
Luft = , Bier = oder Figuren-Rurbit in allen verschiebenen merkwurdigen Formen.	ire,	Neue Imperial-Bwerg-Bufchels 10 Reue grunbleibende 3merg-Bufchels 10	Ruta graveolens 48 Salvia officinalis 32
Cucurhita Molangae	0.000	Große Bohne mit purpurnen Bluthen, ju Ginfaffungen. 12	Spartium junceum
Gin Sortiment von 40 Sorten von jeder ! Portien	1 8 8	Bon ben meisten der obigen großen Bohnen Binnen auf Begehrüberjährige gegeben werben. Bekanntlich fegen biefe beffer Shoten an, als die frifcen.	Tanacetum vulgare
Sehr großer Centner-Kürbis	" 8"	Refte große meife	Taymora valgaris
fen weißen Bluthen, ftarkfletternd, und besonbers fcon		Beste, große, weiße       5         Kleine, weiße       4         Sehr große, spanische       20	Verbaseum Thapsus
gur Dedung von Banben, Lauben u., 4 Corten n gemifcht à Portion 6 A		Sehr große, fpanische 20	

ZEGELEN 4) Graser: Samen.

And Bradstehende Graser find sammtlich in ihren resp. Sorten ganz rein und echt, auch von aller Spreu und Untraut gereinigt, daher die Preise für solche pure Waare auch sehr dillig im Bergleich zu Samen, der, wie haufig der Kall, weder echt noch gereinigt versauft wird.

im Bergleich zu Samen, ber, wie haufig ber	9,	101011	enje nonj gerennye	pertungt totto	nananan resa Jeogla	the En	growick man Armal als from the commonweal water a so and
Rafen-Grasfamen, immerwährenden ober dauernden Rafenpla	цен.	Bromus	arvensis, Accertrespe. biese im folgender	NB. Im Aug	uft ausgefaet, liefert	/S	Empfehlenswerthe Difdungen
fer, aus mehreren feineren, und im Bachsthume mit einander fich bertro	genben	01	distachyos, zweibarti	ge Treste. Hai		12	Futtergräfern.
Größen zusammengeset, erzeugt nicht allein Rafen, des fconften Grüns, hat auch den bewährten Bortheil, daß, daer ganz für unser Klima geeign Jahr zu Jahr fich felter anwurzelt; dahingegen es bei andern Gröfern	et, von viel ber		inermis, grannenlose laxus, lose		100 % 15 % —	20 20	bemerken, daß dieselben keinespreges, wie gewöhnlich der Fall ift, in gemischte Andbe geerndiet, oder aus dem lieberfuls, mit Unachtiankeit zusammen geworf stegen – sondern sie wereden aus den reinen Gorten, und mit Gacktunde in
Fall ift, das fie nach bem erften Jahre sowohl burch anhaltenbe Durre, als	prenge angus	日	mollis, weiche Futteri pratensis (erectus), rubens, röthliche Tre	Biefentrespe		3 12 20	Berhaltniffe gewählt, als erforderfich ift, die Mifchungen gu ben resp. 3mee bilben. Daber man bei benselben bas Borfinden von Uneraut. Spreu ic. fo
gebenben Beschaffenheit bes Bobens, beffen Lage ic. ic. ju nachftebenben gemacht. b. Da eine zwedmäßige Behandlung eines Rasens bie Fortbauer	<b>FORMER</b>	Cynosu	secalinus, Korntresp grus cristatus, Kamm		100 # 15#—	3 20	als unpaffende Arten ju fürchten bat. — Es wird daber erfucht, bei Ertheilung Auftrages, die Beichaffenbeit des Bobens ic. genau anzugeben.
Schönheit bedingt, so wird auf die zu biefem Zweite verfaßte A lung von J. G. Booth: "leber Anlegung eines engl	bhand=	Also Car	is glomerata, Knaulgi	2te —	32 // -	7 6	Gine Difdung ber nuglichften Grafer und Aleearten fur hornvieb; fur leichten, trocenen ober Geeftboben, fo wie eine fur
Rafene fur unfer Rlima." Samburg 1837, - hinge	wiesen.	et	n fehr ergiebiges Gras, baj trefflich gedeihet. glaucescens, grangr		gähem Lehmboden vor-	20	fchweren, ober feuchten Boben 100% 24% - Kine bergl. für Pferbe; für leichten, trodnen, so wie eine für schweren, feuchten Boben 100 % 24% -
Grasfamen zu bauernben ichonen Rafen, 100 # 45 # -	8	Elymu	s arenarius, Sandhafe	r (auch jur Befefi	igung bes Flugfandes als obiger Arundo	~0	Gine bergl. fur Schafe ". 30 " - Gine Mifchung von Grafern zc., fur fchlechten Moor, fo wie eine fur
Grasfamen ju bauernben Rafen, wo biefe ungewöhnlich		8	giganteus, Riefen :	Later Tomonic	Apr 44 High	60 80	geringen fanbigen Boben. 100 % 20 \$ -
fein und ichon gewünscht werben, und baber nur tofispieligi Arten bagu gemahlt werben burfen. — Diefer Samen reich		07	tener.	90 <b>- VIII (</b> 100 - 15	— 8 "		5) Kleearten.
bagegen weiter als ber vorhergehenbe		Festuc	duriuscula, harter & elatior, Bicienichwi	Schwingel		10	Großer, weißer, fcwebifder Riee (weiß, in's rothliche fpie
tung von Baumen, aus bagu geligneten großblattrigen Graferr bestehenb 100 % 54 % -	10		A STATE OF A LONG TOWN		rgiebig ist, fondern sich n gleich gut eignet.		Trifolium hybridum 4 2 4 2 - Bot Unm er f. Diefe Rieeart ift bei jedem Ralfegrad ausbauernd und volle
Desgleichen zu bemfelben 3med als letterer, aber aus lau ter feinblattrigen Grafern bestehenb	20		— var. fertilis, (5	inclair) ergiebiger	Biesenschwingel, 100 % 40 % -	8 20	verennirend (hier bei und bereits 7 Jahre). Sie liefert einen Ertrag, der gewöhnlichen rothen Riee's nachtommt, indem sie viele lange Stengel treibt, weicher als jene des erstern sind ; "auch verindge ihrer bräftigern, sich ausbre
ines, engl. immerwähr. Rafen-Raigras, Lolium perenne		32	fluitans (Glyceria	gras, Manne	gras, 100 % 40 %	7	geberen Wurgel fich ihre Rahrung bei Durre ficerer verf hafft und baburch nachficieft. Der bobe Preis bes Samens, welcher burch ben bis jest noch geringen f
tenue, von guter Ausbauer und lebhaftem Grun, 100 % 45-8-	8	100	befonders paffend zu und weil es ein	naffen und feuchtei ehr füßes Gras, von	Wiefen, wo es ergiebig großem Werthe ift.		bebingt wird, mußte tein hinderniß fein, beffen Anbau wenigstens jur Samer nung ju betreiben. and berteiben betreiben betreiben, and betreiben, bei betreiben, bei betreiben, bei betreiben, bei
review gangwerg light me englishers 20 others augmented angleistes			gigantea, (Sinelair) glauca, grauer Schu Hallerii	Riefenschwingel ingel	100 % 50 ∜	10 20 20	NB. Die nachfiebenden Preise des rothen und weißen so wie des Eugern Alees gegenwärtig (ult. 1844) gültigen, und nicht als festliebend zu detrachten im späterism vielleiget höher oder auch niederiger geben können. 3000 et
Sutter-Grafer etc.	3 1230	-	heterophylla, verfd loliacea, loldartiger	and branchen	dwingel	24 10	fo Vicia cracca 8 a le
igl. Raigras, Lolium perenne, echte perenn. Sorte, ber Sam	e	6 n)	ovina, Schafschwing — tenuifolia, pratensis, großer M	fcmalblattriger .	36 " —	7 12 6	Groffer rother Rlee, Trifolium pratense, beste neue oberlanbifch und frangofische Saat, Ifte Qualifat 100 & 42a48 2 -
aus England, und alle von letter Ernte.  1fte Qualität, ausgezeichnet rein	- 6		unftreitig eins ber Grafer; von So	empfehlenswerthe	den ber grofwachfender n gleich gern gefreffen r magern Boben liefer	1 (34)	gute 2te 36a40 " - Beifer Rice, Trifolium repens, beste neue oberlanbifche Caa
2te - fehr gut - 25 " - 3te - ebenso, aber weniger gereinigt - 20 " -	5 4	-	es reichlichen Er	rag.	100 # 50 # -	10	1fte Qualitat
ngl. Raigras, beutscher Samen		Glycer	ia aquatica (Poa aqu fluitans (Poa fluit	ans) (Festuca f	uit.)		Rother immermahrender Biefenflee, englifches Cow-Grass, Trifo
mithin für eine reine Aussaat auch nicht fo empfehlenswerth als jene		Holeu	s avenaceus (Avena e	1fte D	ialität 100 % 45 4 –	8	Rother immermahrender Rice, neue Barietat von vorftehendem, ale Duke of Norfolk's Cow-Grass befannt.
eutsches, ordinaires, sogenanntes Raigras, (Trespe)	3	-	lanatus, Honiggras	1fte	- 40 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7	Sochrother oder Infarnatflee, Trifolium incarnatum, bester reine
allenisches Raigras, Lolium aristatum (italicum), 1ste Qualität, vorzüglich echt und schön	10	Comb	mollis, echtes, weich	2te 28, ranfendes Hon rreiches Gras, befo	iggrae	20	Beinftengel. ober Sabenflee, Trifoliumfiliforme
2te — sehr gut . — 45 " — 35 " — 35 " —	8 6		Beiben ober für empfehlen. odoratus (Hier	trocenen leichten	uch moorigen Boden gi	1	Belber immerwährender hobfenflee, Medicago lupulina, 1fte Dualität
angofifches Raigras ober hafergras, Avena elatior ob	r		eum murinum, (zur X n aristatum (italicum)	eftaubung von bu	rrem Sanbboben)	10	Blauer Lugern ober emiger Rice, Med. sativa, echt frangofiliche Cao
Holcus avenaceus 1ste Qualitat 100 # 45 N - 2te - 40 " -	8 7	duality	multiflorum submut italienisches Raign	icum, Neues	großes, vielblumige	40	1ste Qualitat, ertra icon 100 8 80 % - bo. fehr gute 2te - 100 8 42 bie 50 " - Beifer Meldotenflee, Steinflee, Melilotus alba
mothegras, beste große Sorte, Phleum prateuse, (hiervon ist der Preis, dem Mechsel unterworfen.)			Erfcheint ergiebiger	als bas bekannte	italienische Raigras un Aussaat von fehr star	# 1	Wir machen darauf aufmerkfam, das dieser allbekannte weiße Melitoter fice feit ein paar Jahren als eine ganz neue, unglaublich vorthei
für die 1ste Qualität, vorz. rein 100 % 40 - & - 2te - fehr gut 36 " -	- 7 - 6	00	arvense, jahriger & perenne, engl. pere		* 6.0. ©	14	hafte Sorte unter ber Benennung von "Reuer Riefentlee" &ct. 3 boben Preifen ausgeboten und angepriefen ift, indes bei weiter
oniggras, Holeus lanatus, 1ste Qualität, vorzüglich schön 100 % 22 ¾ 8,	3 4		engl. Raig	gl. Samen, fiehe ras, beutscher Sa	nebenstehend -	in in	nicht fo groß wird, als nachstehender. 50chfter weißer Melilotenflee, Melilotus alba altissima
2te — febrgut — 18 » —	4	91			Raigras, f. nebenfiel	8	Blauer Rafenflee, Trifol. coeruleum, jur Bereitung bes Schab-Bieger fafes bienenb
1911 (1913) 1914   1914	- 7	VI	var. Wh	itworthii, Whit selianum, Ruffe	ney's Raigras vorth's Raigras L's engl. Raigras	12	Gelbet Melitotenflee, Melilotus officinalis 100 % 25, Größter gelbet do. Melilot. macrorhiza, (Trifol. macrorhizum, Sinclair) wirb 7—8 8 mß bod,
lesseld all poet blete estd elect tabelle im August end brite aber blee ninge.	6	Melic	a altissima, höchstes S	üßgras, Perlgras		. 80	Eurfischer Riee, Esparcette, St. Foin, Onobrychis sativa, befte Dualität 100 % 32 %
irfenfuchofchwanggras, Alopecurus prateusis, 1fte Qualität, vorzüglich rein	16		weiches Gr	a6.		24	Desgl. zweifchüriger, Oaobrychis sativa biferum
2te — fehr gut — 60 "-	12	Molin	ciliata, behaartes ia coerulea, blaues für Moo	bore und moorigen Be	100 % 25 % -	5	Gehornter Schotenflee, Lotus corniculatus
liesenschwingel, Festuca pratensis, beste Dualität, vorzüglich schön	- 6	Panie	um germanicum, (Se	taria germanica	beutsches hirfengra	32	Spargel Schotenflee, Spargelerbfe, Lotus tetragonolobus
spen- oder Biefengras, Poa trivialis,		05	italicum, (Setaria	italica) ifalieni	ches alraff muialt an		6) Futterfrauter.
1fte Dualitat, fehr rein und echt 100 # 75-% -	12	Phala	ris arundinacea, Rol	rglanggras	1 Abth. 8 aufgeführt.	20	Reues Futterfrant, Meracleum sibiricum.
rostis alba, Straufgras mit weißen Ranfen 100 % 70 4	12	B 0 0 1	Diefes Gras, auf gutem Quantitat bes Ertr fast ein weiches Er bleibt. Es ift fast fr	jedoch nicht zu trock ags alle übrigen Gr as nennen, wenn	nem Boben, übertrifft ifer Auch kann man es nicht zu lange steh	n 16	Wir machten icon von vier Jahren darauf aufmerkam, das die Pflange ein aufstrodentlich ergiediges, allerfriedeten no dem Musterbach febr gelügender Staddingsburtter genöhre. Wir derfinanzier möchere f. M. ihr nammt im Auril 1846, die Pflangin Vier den den den der der fie fic in den Austria den der der der der der der der der der fie fic in der Austria der
- capillaris, Straußgras, haarfeines 100 % 60 1/4 - spica venti, Windhalmgras 25 - 25 -	12	Sep.	gemaht zu werden. um pratense, Timothe		long market from Towns	in ha	then damit im April 1840, die Pflangen I Bug auseinfender, und hab- fie fich in den Wintern bon 1840 - 44 ohne alle Bedeckung als ausbungend be- mabet. Wit Einteit bed Archings brieben fic foolgieb, und unge fo floor
vulgaris (stolonifera), Fioringras 50 -	- 9	Poa	annua, einjähriges Rie	pengras	Hora Saffer Astron	. 40	wührt. Mit Eintritt bes Frühlings trieben fie fogleich, und zwar so ftar das ihre jungen Blattre bereits 1 bis 21/3 Auf boch gerhoffen waren, end- gend eine Rieeart anfing zu treiben. Da die Pflange wührend bes gangen Sommers junge Blatter treibt -
ra caespitosa, Raicnichmiele 100 % 25 \$-  — Intescens, gelbe, weiche 50 m.  ria au empfetended ninklides Inas.  — discolor, entiaute. Portion 8	10			an Graben ober 1	lfern) 100 % 36 24 -	- 7	felbft wenn die vorhergegangenen nicht abgeschnitten, sondern in ihrer ga
ein ju empfehlendes nühliches Gras.  discolor, entfärbte. Bortion 8	B	- 1	compressa, plattstengel Certilis, ergichiges Risp	engrad	io main un politicamen	16	und nedenbei Samenftamme von 8 flus bod ernifert. fo is der Cetrea e Ernigatter wildere die Sommers mendlich groß, wenn is Buffter, fo of fie 2 flus Edinge erreichen abgenommen worden. Die Schafe, fersien begit ig jedes Bischen der Blattfliefe, felbst der Alteren Bickter. 1 Poetion-w Son Schreef 1 2-
flexnosa, Kilfterschmiele 400 % 30 %  juncea, binsenartige Portion 8  seabra, rauhe 8	13	8 1	luitans (Festuca flui Mannagras caesia, meergrünes Ric	www.manner	10078 40 1/2	7	Dais, fürfischer Baigen ober indisches Korn, als sußes, nahrhaftes m
opecurus agrestis, Feld-Fucheschwanzgras 100 % 45 %			emoralis, Hain Rishe	naras.	50 " -	10	überaus ergiebiges Grünfutter. Bimperuell, Potexium sanguisorba, auch als nügliches Schaffutt
geniculatus, gegliebertes.  nigricans, fchwargliches; — ein fehr zu empfehlenb		"	auch befonders zwedmäßig ergtebiges Futtergras, i gras unter ichattigen b	an ichttigen Stell ondern auch als bi Baumengu empfehle	en, und nicht auein als e fonders hübsches Mase	1=	Begebreit, langblättrig, Plantago lanceolata, febr nüglich bei Uni gung einer Beibe 100 % of be Schafgarbe, Achillea millefolium, besgfeichen
frühes und fehr ergiebiges Wiefengras.  pratensis, Wiefen-Huchsfchwanzgras, ein sehr frühes, giebiges und überhaupt sehr zu empfehlendes Wiefe	20	-	pratensis, glattes Risi trivialis, rauhes —	en= ober Wiefeng		20	
grad 1ste Qualitat 100%90%	16		als eins ber vorzügli	2te	- 60 " -	10	
athoxanthum, odoratum, Riechgras, icon gereinigt	20		cia, fiche Panicum.		iar, Scientific große -	Rest	ale bie nachftehende, bieber ale bie größte befannte Art; (au
ungereinigt	14	Triti	cum caninum, Hundsq — giganteum, Rief	uafe	Port. 8	3	Spergula sativa ber früber ale größter Sporgel befannt, -
rundo arenaria (Ammophila arenaria), fafter Sanbhafer (; Befestigung bes Glugfandes febr bienlich) 100 % 40 %		37/4	— repens, Waizeng Wurzeln davon find den	uafe	S AND THE PARTY OF STREET	12	2te aufe
rrhenatherum avenaceus (Holcus avenaceus) oder Avena elatic franzöfisches Raigras 1st Dualität 100 B 45 K 2te — 40 n	or,	Trip	roßer Quantität gegeben sacum dactyloides, &	, als blutreinigenb ama : Gras, fann	fehr bienlich. im norblichen Guro!		Symphytum asperrimum
40 "			nicht mit Ru	gen fultivirt werd	en. the moon mann		gennjutter im grunjahr und von da bis im ipalen Derbite. — Der fi fparlame Ertrag von Camen, ber überdem bet einzelnen gernern gefa
brachypodium sylvaticum. Balbirespe ober Balbicingel, fonders anwendbar unter Baumbefchattung	06=	State of	LOS XP 601		where were Solve	12.00	Forn fich aber aus folder Dortion ofmiges humbert Milanton and then

AT TANK	1 Pfunb	(Braffer: Camen.	Pfenb	Farbepflanzenfamen.	Pfunb B
Großer Feldpastinak, Burgel und Kraut als nahrhaftes Futter 100 % 36 & —	8	Gruntopfige, gelbe Stedrube	20		12
größter englifcher	20		30		24
Sichorie, Burgel und Kraut als fraftiges, milchvermehrendes Futter	10	2Ветре до. до	24.		32
Bunias orientalis, die hauptsächlichste Eigenschaft bavon ift, bag es zu ben fehr frühen Grunfuttern gehört	16	Gelbe bo. bo.	24	Rermesbeere, Phytolacca decandra	
Centaurea Jacea, braune Flodenblume, besgleichen	40	Große, weiße, runde	32	a	12
Brenn Ressel, Urtica dioica	8	Hood's neue, große, gelbe 52 Pollexfen's yellow Bullock 52	30	Indigofera tinetoria, echter Indigo Bortion 8 3	12
Stachelginfter, immergruner, Ulex europaeus, (vortheilhaft in Bilb:	111073	Grunfopfige Imperial yellow	30 30	Polygonum tinetorium, Indigo-Buchwaizen Loth12 &	260
gehegen)	40	Rothföpfige bo. bo. \$\frac{1}{2}\$ Reue weiße, rothföpfige Baftard-, extra	40	Diese neue Farbensanze gedeihet hier bei uns vortrefflich — wird gesatt und gedaut wie Buchvalgen oder haldedonn. — Ein Gentner Blitter und Kraut lieset eichilich 2 K indigsoldaue Farbe — sehr zu empfehlen.	
Englischer Ginfter, Genista anglica, besgleichen	32	Feldrube, frangofifche, lange, weiße	16	Tabad.	
Tanacetum vulgare , Rainfarrn, wovon befanntlich die getrodnete Bluthe gur Bertreibung bes Kropfes bei Bferben ein wirffames	(lagnin	rothföpfige	24	With the second of the stables ability demonstrate and upprintended the high	80
Dittel ift	10	Stoppelrube, beste, gelbe, runbe	16	Chinefischer, ftrauchartiger Ranafter	
Saponaria officinalis, Seifenfraut, das Kraut als Futter, die Burzel	20	beste, weiße, plattrunde Weiße Steckrübe	20	Gewöhnlicher, rund- und biatblattriger ameroforter. Brafilischer, febr großblattriger Loth 12/3	24
the Fire Free far leighter, rectuen, to mic cine in infimmen	176 27	Runfelrube, vorzuglich große, über bie Erbe bervormachfenbe Sorte,		Reuer großblattriger aus Salonichi	
Biden und fonftige Bulfenfruchte.	and an	ertra, 100 % 30 4 —	6	Bachsbluthiger, fleinblättriger — 4 . Rispenblüthiger — 4 .	
geringen fandigen Boten 100 % 20\$ - 1	Pfund	neue, eben so große, gelbe, suße, die mehr Zuder als vorstehende röthliche enthalt, daher als Bieh-		Zartarifder, bidblattriger 1300 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	0 (1
Gang neue fchottifche Bice, ausgezeichnet futterreich und		futter sehr zu empsehlen 100 % 45 % - eben so große, weiße 100 " 45 "	8	Sehr lang : und schmalblattriger	(e
von weicher, schönfter Qualitat, gang besonders gum Anbau gu empfehlen	24	neue, große, rothe, runde, vorzüglich nutliche Sorte gelbe bo. bo.	10	Und andere Sorten.	
Große beste brabanter Wicie sativa	3	Sucterrunfelrübe.	estace	Sagogen weiter als ber norboraciones 100 % 80 % - 44	
engl. Bide, Norwich Bide, vorzüglich icone Sorte, engl. Samen 25 " -	6	bie anerkannt beste, gang weiße, zuderreichste Sorte, vorzüglich 100 % 28 \$ -	5	9) Getreide.	10
- engl. Binterwicke, Vicia sat. biennis, engl. Samen , 25 , -	6	- neue, wiener, tellerformige Buderrube. Loth 3 B			Führen
— besgleichen hier gebaute v 20 " — Die Winterwide wird im Berbit gesäet und bleibt den Winter über 3 bis 4 Zou	4	Burgel, gang vorzüglich große, fuße, rothe, englische Altringham-, jum Futtern fehr empfehlenswerth; faet man fie ziemlich weit-		Außer nachstehend benannten, in größern Quantitaten abzugebenden Gorten, fin wir nach wie vor bas gange Gortiment und erlaffen baraus:	20 63
hoch fteben, um im Brubiabr ein febr geitiges Grunfutter gu liefern.	O TYGH STITTIO	lauftig in einen tiefgeloderten Boben, fo fann fie mehrere Bichwer werben	32	80 Sorten, von jeber eine reichliche Bortion für	204 15 v
Seit mehreren Jahren hat fich diefes als für unfer Klima paffend be- mahrt.	713	- Reue, große, weiße, gruntopfige, fuße Futterwurgel -		A cool funiversale Rafen-Rajarag, Laliam percuac-	avis?
Große, weiße, amerifanische, Vicia sativa alba (americana)	12	wächst ziemlich hoch aus ber Eroe hervor — wird früher als bie andern groß — und ift sehr ergiebig	32	Baizen. Wir machen barauf aufmertfam, daß wir im August von	B
Großblühende Bide, Vicia grandiflora	40	gewöhnliche, lange, rothe, braunschweiger	14	einigen gang vorzüglichen englischen Baigenarten angubieten	
Neue sibirische Wicke, Vicia biennis, wird im zweiten Jahre 15 bis 18 Tuß hoch	- 11	große, dide Baftinats, ertra, hat jum Anbau ihren besonbern Berth barin, bag bie großen Burgeln mahrend bes Minters		Gerfte, Engl. Chevaliers, febr fcwere und zu empfehlende	
Bogelwide, Vicia cracca " 6 "		im Lande ftehen bleiben fonnen und erft im Fruhjahr her- ausgenommen zu werden brauchen	20	Sorte, aus England bezogene beste Saat 100 % 20 14-	6
Immerwahrende Bide, Lathyrus perennis	32	gewöhnliche Baftinat-	8	fchottische Annat :, von ahnlicher Bortrefflichfeit wie bie Chevaliere, reift aber 8 bis 10 Tage früher,	
bohe, breitblättrige, Lathyrus latifolius Loth 6 β	10000	Rohl, fehr großtöpfiger, englischer Bieh- ober Erommelfohl	72	Saat aus Schottland	6
Beilanische, Lathyrus clymenum, sehr ergiebig an Futter und Frucht Magellanische, Lath. magellanicus, sehr ergiebig	16	Trommel Saveper	24	violette Hymalaja:, fehr schön	4
Behaarte Dide, Vicia pilosa	16	The state of the s	128	fcwarze echte, 63eilige Binters	4
Liebliche Bide, Vicia amoena	20	— Cavalier-Rohl, Chou cavalier — 6 "	io <del>oy</del> li)	Roggen, extra großer Binter Saat 100 % 14 #-	4
Thouin's Bide, Vicia Thouinii	24	- Chou branchu, frangofifcher, aftiger Futterfohl 8 "	-	- befter Sommer	3
Bid'Linfe, Ervum Monanthos	5	— Taufendföpfiger Blatterfohl 8 "	0-4-22	Gine vorzügliche Art, die fehr zu empfehlen. In Korn und	
gewöhnliche Sorte 18 " —	3	Ruh: Rohl — oder Cow-Cabbage.  Cesarean Cow-Cabbage	8 %	pormaliches Mehl liefernh Er min paiffile fall &	
Grune Felberbfe, große, fcone, fruhe Sorte v 24 " -	4	Bemerkungen über diefen Rohl, fo wie über ben frang. "Chou Billaud	300 50 41	nur als ber gewohnliche Roggen gefaet, indem aus einem Rorn 12 bis 18 Sulme fpriegen	int?
Graubunte Königsberger # 16 " -	3	finden fic ausführlich in unferm Catalog von 1841.		Safer, Engl. Hopetoun-, vorzüglich fchwere und ergiebige Sorte,	4
neue fehr volltragende 4 Fuß hohe, extra	4	emorbies en		aus England bezogene Saat 100% 18%	6
Sehr volltragende braune Felberbfe, Lathyrus Ochrus Diverfe andere Sorten Felberbfen, bei fleinen Quantitaten	6	com murinum, (nu Behan Survey Carolista) 10		- Rartoffels, desgl. 20 - 20 Schottifder Berwicks, gleichfalls vortreffliche Sorte,	6
Linfen, biverfe Sorten, fiehe Gemufefamen.		Sonftige Deconomiefamen.		aus Schottland bezogen 100 % 20 %—	6
Pferbebohne, befte Corte	3	italienitetes Statycol.	Pfunb /3	Befonders brauchbar und zu empfehlen als fraftiges Grunfutter.	4
— besgleichen Saat aus England	4	Leinfamen, echte rigaer Cae-Saat per Tonne von ca. 180 # 34 a 36 # -	6	- Engl. Binter-, wird im Gerbft gefaet 100 % 30 4-	6
große Sorte " 25 " —	6	Sanffamen 100%14 a15 " — Biemontefifcher Riefenhanf, extra	3 60	Buchwaigen, tartarifcher ober fibirifches Saibeforn, Polygon.	6
niedrigbleibende, frühe volltragende , 25 " — Taubenbohne, beste Sorte , 14 " —	6	Vanariensamen 100% 14 a 15-¾ — Bogelrubsamen # 12 a 14 # —	3 2	gemeiner, beste Saat, Polygonum fagopyrum	3
gang fleine, fogenannte helgolander Bohne		Genf, gelber " 18 a 20 " -	5 8	- geränderter, Polygonum emarginatum Bortion 8/3	32
(A) State (A) State (Coerneens) are coroning coe Sance (A) State (		— englischer, ertra " 30 " — braumer " 30 a 32 " — 6	8	Sorghum saccharatum, amerifanische Maisbirfe " 4 "	
7) Futterraben, Futterwurgeli	ıt.	Şirfe, Mipenhirfe, weiße, Panicum album  fichwarze nigrum  rothe nigrum  gemeinegelbe miliaceum	16	dulqras, Bactylis glossersta.	
Rachstebende Gorten Futterruben find bie, welchen man in England bei	Bor=	gemeinegelbe miliaceum	6	10) Blumen: Zwiebeln.	
gug giebt, und wovon jede baburch ihren befondern Werth hat, daß fie fich mei minder für biefen ober jenen Boben und Lage eignet.	)r ober	- Rolbenbirfe, bunfelgelbe	8	Ein Bergeichniß uber biefe erfdeint jahrlich im August und enthalt eine große	Hus=
Da hier und in Deutschland ber Rugen einer ausgebehnteren Rultur ber	großen	— blaßgelbe	8 12	Gin Bergeichnis uber biefe erfcheint jährlich im August und enthält eine große mobl von Spaciathen, Auben, Accetten, Parciffen, Grous, Rafferk Lilien z. bei inbessen mit 16 November verfandt merben beinnen, bai machtebende auch noch im Frühigdr gepflangt werden.	onen,
Ruben von Jahr ju Jahr mehr Anerkennung findet, fo haben wir auch die Ar ber Sorten completirt, und bieselben mit naberer Bezeichnung verfeben, bam	it jeber	Mais ober turfifcher Baigen ober inbifches Korn, großer gelber	8	Anemonen.	K B
genau bie Sorte, welche ihm am wunschenswerthesten scheint, anzubau Stande fei.		großet gung dungetetet großer rother früher, fleiner gelber Zea praecox (amerifanischer dwarf Corn).	10	Borgualich foone, gefüllte, in allen Karben untereinander, blibbare Knollen.	
Der bei jeber Gorte angegebene Umfang ift nur als von guter Mittel Beineswegs aber als bas Maximum ber Große, die die Rube erreichen bo	mn 111	gelangt felbit bei dem ichtechteften Sommer zur volle	Panie	Lauter gang neue, prachtvolle Sorfen melirt. 7er 100 Stud 6 Gin Sortiment von 100 gang neuen, prachtvoll. Sorten mit Ramen für 25	5 -
betrachten, indem die kleinften fich darunter befindenben Sorten bis 10 Pfd. Si die größern aber bis 15 Pfd. pr. Rube, in Kelbkultur erzielt worden find.	hwere,	gen Reife gang fleiner Perl-, hat eben bie gute Eigenschaft wie ber vorher-	10	Lauter gan neue, prachtoolle Gorfen meliet. "109 "106 (m. Gorfinent von 100 gan neuen, prachtvoll. Gorfen mit Ramen für 25 Desgleichen von 50 gan neuen. "12 Neue, große, gefüllt, scharfachrothe, Scarlet superh. "2002 Dußenb 38 Neue. auserorbentlich arose, accordinenstifistie, scharfach aefzillt.	8
rainmitainme ( an	Pfund	gehende	20	Rieinblubende, einfache Anemone, Anemone hortensis, nieblich " 2	3 12
Große engl. Rube, white Globe Turnip, von glatter weißer hauf, weißem Fleische, ovalrunder Form, 24 Fuß im Umfange	20	Anis, gang reiner, frifcher Samen	6	gef. Anemone, Anem. hort. fl. pl. coccin., hubfc " 2 Großbluh. einfache chinefische Anemone.	
Desgl. Dales hybrid., neue, große, icone, glatte, melonenformige Rube, von gelbgruner Gaut, hellgelbem fleische, gegen 2 Tug	Splian	anns, gang reiner, fritger Santein. 1008 348 358 358 358 358 358 358 358 358 358 35	7 6	Diefe prachtvolle Blume kann man von Mai bis December in Bluthe haben, indem man die Pflanzung der Knollen monatlich	N.
Rube, von gelbgruner Saut, hellgelbem Fleische, gegen 2 Jug im Umfange	30	Gorianber, besgleichen . 20 , - Beber- ober Euchfarben, große frangofifche . 20 , -	4 32		
Desgl. Pommeranian Globe, Saut und Fleisch weiß, plattrund,	erdhar saftes	Mebers over Auchfarden, große französische Mermuth, der echte, Artemisia Absinthium Loth 3/3 Schwedischer Kassee, Astragalus boeticus	48	Gine Melange, in ben verschiedenften Raancen von hodroth, blau, bunt, violett'u, in febr farten, blubbaren Knollen	5 -
Description to the same of the	24	Bum Gründungen.	809	Ranunfeln.	
plattrund, 2 gup im Umfange	24	Rene Art Spörgel.		Marrialid China askilles in allen Clarkes and a second	8
Desgl. Lawton hybrid., neue große	30	Spergula maxima - größter Sporgel - fehr gu	CONT.	50 fehr schone bo. bo. "	8
Desgl. white Norfolk Turnip, Fleisch und haut weiß, plattrund, Mittelgröße 2½ Fuß im Umfange	20	empfehlen — ift viel größer, ergiebiger und weniger empfindlich als die nachstehende, bisher als die größte befannte Art; (auch		Brennendrothe Turban = ober romanische Ranunfeln 100 3	3 _
Desgl. green top white Globe, von grüner haut und weißem Fleische, fugelformig, 2 Juß im Umfange	10.000	ift ber Same ganglich bavon verschieben) 100 % 40 \$ -	8	Braune Turban-, febr icon	8 -
Desgl. green round, von gruner haut und weißem Meifche, platt-	24	Spergula sativa — bet früher als größter Sporgel bekannt — liefert gleichfalls ein schones Gutter, selbst wenn erft nach ber		Braune Authons, fedr fohn 100 7 (Seibe türfiche ober Merveilleuses jaunes. 100 6 (Oplir, großlich, beligdt mit schwarzen Spiţen, schr schwarzen Delin wir, etra schwarzen schwarzen weiter den weiter den der Hercules, erinwieß. 1 Hercules, erinwieß. 1	1 8
rund, 2 Fuß im Umfange	24	Roggen-Ernte ausgefaet.		Hercules, teinweiß. " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2
Desgl. Altringham, neue, feste, haut und Aleisch bunkelgelb, 14 Fuß im Umfange.	24	Die beste Dualität	2 2	Gladiolus byzantinus, großer rother, fehr icon per 100 Stud 7	7 8
Desgl. Aberdeen yellow with purple top, die Saut purpur- roth, bas Kleisch bunkelgelb, 2 fuß im Umfange, seite Rube		Lupinen, große weiße " 15 "	4	cardinalis, prachtiger, ichartachrother Kardinalis: " Dugend 4	4 -
ertra	20	3um Delfchlagen.		— fl. albo, meißer " 2 floribundus, wießbütdiger, fehr (chön, blühbar " 3 psittacinus, (dön getigerter, blühbar " 1	2 - 3 8 1 4
Desgl. Scotch or Bullock, grünföbfig mit gelbem Fleische, freisels förmige, seste Rübe, 24 Fuß im Umfange, extra	22	Rappfaat, Binters, große Sorte	4	ramosus, neu und prachtvoll " Stud 6	6 —
Desgl. Reue improved purple top vellow Bullock Turnin		Commerrubien, Barger, reift fehr fruh	5	Amarplis Atmares	
Desal. purple top Swedish febr große rathfanger auffe Courte.	40	Mohn, blauer, mit großen Röpfen	6	Amaryllis Atamasco	5 _
Stefribe ober Rutabaga, als vorzügliche Sorte zu empfesien (erreicht das Gewicht von 12 a 15 %)		Mohn, blauer, mit großen Röpfen — mit großen gelichloffenen Köpfen — großer weißer, mit do. Chineflicher Octrettig. Leinboder, Myagram sativum 100Æ15.X—	8	Amaryus Atanasco. — per Gene   Beladonan major   2   2   2   2   2   2   2   2   2	4
Reue, rothgranhantige, glatte, gelbe, englische Riefen-	20	Chinefischer Delrettig.	16	longifolia fl. albo, weiße langblattrige	8
The state of the s	40	Ber Anbau diefer ergiebigen Pflanze, die auch auf leichtem und fage	4	lutea, tieine geibe, (Stembergia lutea)	8
NB. Mir tonnen nicht umbin, diese weie Gorte angelegentlich jur em- pfroben, da fie beinobere fest und dauerhaft ilt, und die ungewöhnliche Schwere von ihrer 21 K, nach Arnahme des Kopfe im der Murgel, ertangt hat. Beichlich so wies Berücksichtigung vervient auch bei		Der Andau dieser ergiebigen Pflanze, die auch auf leichtem und fogar geringem Boden gut gebeihet und flets eine reichliche Erndte fichert, tann empfolien werben.  Madia sativa, neue Delpflanze			3 12
erlangt bat. Reichlich fo viele Berudfichtigung verbient auch die		Madia sativa, neue Delpflanze 100 % 30-2/ Gultur-Unweifung zc. wird bem Samen beigefügt.	8	Tuberose . Polyanthes tuberosa, blübbare Bwiebel nr Stud -	- 4
Gang nene, fehr glatte, feste, große, gelbe, rothföpfige, icon geformte Laing's, fehr gu empfehlen	40	Sanf, gewöhnlicher 100 % 15 %	3 60	Ixia tricolor, breifarbige Stie. Tigridia pavonia (Ferraria tigridia), Liger-Teiß ober Pfauensphesel, yne Dugend I	3 -
and the second s			Jul	Ihuilar, Mr vandano	

## Strander : Samen.

## a) Wald-Camen.

a) Wald-Camen.	- 1
Bir geben bekanntlich keinen Waldsamen ab, der nicht zuberlässig gut if muß berschie nicht nur frei von jeder Beimischung sein, sondern es vort jegliche Mube angervandt, um sin von leichten und tauben Könnern gurei	t, aut b felb iniaen
The state of the s	Pfun
Zanne, Rothtanne ober Fichte, beste Dualität. Diefes Jahr (1845) vorzüglich gut100 # 45 \$	8
- Beiß- ober Geltanne, biefes Jahr teine Ernbte Lerchen-, vorz. schöner, frifcher Samen	20
Riefer ober Fohre, extra ichoner Camen	20
Schwarzfiefer, Schwarzföhre, Pinus austriaca, von allen Riefern ber vorzüglichste Waldbaum, sehr zu empfehlen	48
Benmouths:	60
— Berge ober Krummholge	20
Ahorn, weißer. 100 # 36 # platanenblattriger ober Lennen - 50 v	6 9
Felb:	20
- 3uder, Acer saccharinum, als Balbbaum zu empfehlen Guer ober Erle, gewöhnliche	10
echte weiße, ober nordische Bergeller	24
— herzblattrige, fehr ichnellwuchfige Loth 12 /3 Birfe, weiße, vorzüglich ichoner Samen 1008 15 4	3
Bogelbeere, Sorbus Aucuparia.	8 2
Gide, gewöhnliche	16
Afazie	24
Line, Der ober Rufter 100 #30 &-	6
Sainbuche ober Beigbuche, reiner Samen 15 "-	3
Beigdorn, zu heden, Crataegus Oxyacantha — 25 "— Sweetbriar Rofe zu heden — ihres wohlriechenden Laubes und	5
	48
Amerikanischer, großer Dorubaum, mit großen, rothen Bee- ren — als Nahrung für Hochwild. — mit großen, gelben Beeren, ebenfalls sur großen,	8
depene	8
Bohnenbaum, Cytisus Laburnum. Bur Schonung anderer Baume und pugleich als Nadrung für's Wild, well biefes die Juveige des Bohenndaums bor allen andern gern nagt, bon großem Ruben, u. baberreichliches Ampflanzen zu empfehten.	12
biefes die Zweige des Bohnenbaums vor allen andern gern nagt, bon arofem Rugen, u. daber reichliches Ampfangen zu empfehlen.	
Stachelgin fier, Ulex europaeus, als Rahrung für's Bild Befenpfrieme, Spartium scoparium	40
Befenpfrieme, Spartium scoparium  b) Shfterne.	
Apfel ferne	36 36
Birnferne	8
Stachelbeer famen von 250 ber größten englischen Sotten Loth 16 3	93
Sohanniebeere, große rothe	
fleischfarbene 12 "	Sta J
Rornelfiriche, Cornus mascula 2 "	24
Simbeerfamen, großte rothe bie ftarfe Bortion 8 gelbe 8 8	ESI.
Grbheerfamen, als:	355
frühe engl. Roseberry, bie volltragenbfte und befte Erbbeere	
— Keen's seedling — 8 " — Wilmots superb — 8 "	
virginische frühe rothe	
weiße Albens	
Riefen- 6 0	Both
e) Maulbeer: Samen.	13
for wasen rothe	12
fr. nigra, ichwarze, tleinfrüchtige #88-&	16
elata, hohe	20
hybrida 12 "	16
nigra, große schwarze  Broussonetia papyrifera, Papierbaum.  Broussonetia papyrifera, Papierbaum.  Sartian 8.3	20
Ir. albo, tetipitatyaget	13A
d) Gehölz: und Straucher Gamen.	251
200 bet Preis für Portionen notirt ift, werben biefe nach Befchaffenbeit bes Samens reichlich groß gegeben.	201   201
Acacia farnesiana, farnesiane ataşte	32
— strombulifera Bortion 4/3	2
he's Camer's ressisté gres gegeten.  Acacia farnesiana, farnesis (Majic. Portion 6 A  Julibrissin, vrientalisse. Portion 4/3  Acer campestre, Achadrun 1814 4/3  dasycarpun, grante Aborn  Levisabna ossississississississississississississi	8 8
monspessulanum, frangoftider	8
nigrum, schwarzer Bortion 4/3 opulifolium, wasserholverblättriger platanoides, platanenblättriger oder Lennen 78 9/3	8
platanoides, platanenblattriger ober Lennen	1 12
polymorphum coriaceum  — pseudoplatanus, weißer  — rubrum, rothbiúhender  — rubrum, rothbiúhender	1
— saccharinum, 3uder — 78 24 8 /8	3
- striatum, gentreister	6 4
Adenocarpus telonensis Bottion 8/3 Ailanthus glaudulosa, Götterbaum 78 10-14	8
rubrum, rothéchipenbet saccharinum, Judfer satriatum, geftreiftet tataricum, tartarifete	12
- erispa, fraueblättrige Bortion 6/3	12
glutinosa, gemeine Noth # 10 - # 10 - # 1 1 1 8 "	1 2
	8
Services, Brings and Services a	200
	20
Amorpha croceolanata, intrantaroiger mounter Snorgo — 8" — fragrans nana, niebriger, buftenber	1 0
Amorpha croceolanata, intrantaroiger mounter Snorgo — 8" — fragrans nana, niebriger, buftenber	1 0
Amorpha croccolanata, idraniarunger wounger sinengo 8 ss. fragrans nama, interiorer, butteriorer fruticosa, itranidartiger, fali@er glabra, glatier Lewisi, Erois ens Bortion 6,8 Anagyris foctida, Eintbaum Andenmeda, 6,8 Octen jebca Bortion 4/3	1 0
Amorpha croccolanata, lafranjarunger wounger sinengo — 8 ss.  gragrans nana, interiger, butterer.  fruticosa, firaudjartiger, falfcer.  glabra, glatter.  — glabra, glatter.  — Lewisi, Ernicens.  Anagyris foetida, Efintbaum.  Andromeda, 6 Gotten.  jeba Portion 4/3  Arbutus Uneda, Groberebaum.	1 0
Amorpha croceolanata, letraniarunger wounger sinengo — 8 ss. frangrans nama, interieger, butterber. fruticosa, firanchartiger, falicher. glabra, glatter. — glabra, glatter. — Lewisi, Ernickens — Bortion 6,0 Anagyris foetida, Eintbaum. Andromeda, 6 Corten. jebea Portion 4,0 Arbutus Uneda, Grobeerbaum.	12
Amorpha croceolanata, letraniarunger wounger sinengo — 8 ss. frangrans nama, interieger, butterber. fruticosa, firanchartiger, falicher. glabra, glatter. — glabra, glatter. — Lewisi, Ernickens — Bortion 6,0 Anagyris foetida, Eintbaum. Andromeda, 6 Corten. jebea Portion 4,0 Arbutus Uneda, Grobeerbaum.	12
Amorpha croccolanata, letranicatoger wounger sineigo 8 s fargaras nama, literitegt, butterber fruticosa, firantipartiger, falicier glabra, glatier glabra, glatier Lewisii, Semis ens Bortion 6 Anagyris foctida, Stintbaum jebea Sportion 4/3 Arbutus Unedo, Stoberchaum jebea Sportion 4/3 Arbutus Unedo, Stoberchaum Arbutus Unedo, Stoberchaum Artestaphylos alpina (Arbutus), Wipen-Strentranbe. Sport. 6/4 Artestaphylos alpina (Arbutus), Wipen-Strentranbe. Sport. 6/4 Artestaphylos alpina (Arbutus), Wipen-Strentranbe. Sport. 6/4 Artestaphylos alpina (Arbutus), Stopen Storentranbe. Sport. 6/4 Artestaphylos alpina (Arbutus), Stopen Storentranbe. Sport. 6/4 Artestaphylos alpina (Arbutus), Stopen Storentranbe. Sport. 6/4 Arabet Sport Sp	8 8 12 20
Amorpha croccolanata, letranicatoger woulger sineigo 8 s fargaran anna, interiege, butterber fruticosa, firantipartiger, falicher glabra, glatter glabra, glatter Lewisii, Senis ens Bortion 6 Anagyris foctida, Stintbaum jebe a Bortion 4/3 Arbutus Unedo, Stoberchaum jebe a Bortion 4/3 Arbutus Unedo, Stoberchaum de Senis Senis Granica Senis Senis Granica Senis	8 8 12 20 48 6 8
Amorpha croccolanata, letranicatoger woulger Sinego 8 s fargrans anan, interiege, butterber fruticosa, firantipartiger, falicher glabra, glatter glabra, glatter Lawisii, Zenisfens Bortion 6,4 Anagyris foctida, Efinfbaum Andromeda, 6 Soctem. jebe a Bortion 4,6 Arbutus Unedo, Grobertbaum Arbutus Unedo, Grobertbaum Artostaphylos alpina (Arbutus), Wipen-Batentraube. Bort. 6,4 Uva ursi, genofinliche 6, Aristolochia altissima, böpic Debertfume 8 s Azalea pontica, gelber Gelfenifrand 4 s von vielen Barietaten 12 s Berberis canadensis, canabiliche Berberige sinensis, fünstliche 8 gebreite vulgaris, gemeine 8 2 k	8 8 12 20 48 6 8 2
Amorpha croccolanata, letranicatoger wounger Sneigh — 8 » fragrans anna, interdiger, butterber fruticosa, firauthattiger, falicher glabra, glatter glabra, glatter Lewisi, Zenniśens — Bortion 6,6 Anagyris foelda, Efinibaum Andromeda, 6 Sorten Andromeda, 6 Sorten Arctostaphylos alpina (Arbutus), flipen-Bitentranbe. — Bort. 6,8 Arbutus Undo, Gröberbaum Arctostaphylos alpina (Arbutus), flipen-Bitentranbe. — Bort. 6,8 Arisatolochia altissima, biodist Spectrifume — 8 « Aralea pontiera, gelter Gefentfranch — 4 « — von viclen Bariciaten — 12 « Berberis canadensis, canabifiche Betretige sinensis, fjunctifiche vulgaris, genetie. — \$2,3/ Betula alba, weije Stife — 3,3/ Betula alba, weije Stife — 3,3/ Betula alba, weije Stife — \$1,4/ — pendula, bingenbe — \$1,4/4 «	8 8 12 20 48 6 8 2
Amorpha croccolanats, letranicanger wounger sinego 8 s fargrans nama, niteriter, butterber fraticosa, firandartiger, falidier glabra, glatter glabra, glatter Lewisi, Remérales Bortion 6 A Anagyris fortida, EtinBeam jebea Bortion 4 Arbutas Unedo, Groberchaum Andromeda, 6 Sorten jebea Bortion 4 Arbutas Unedo, Groberchaum Arctostaphylos alpina (Arbutas), Mipen-Bärentranbe. Bortion 4 Arctostaphylos alpina (Arbutas), Mipen-Bärentranbe. Bortion 4 Arctostaphylos alpina (Arbutas), Mipen-Bärentranbe. Bortion 4 Arctostaphylos alpina (Arbutas), Mipen-Bärentranbe. Bortis 6 Aratolochia altissima, Modific Petertiluma 8 s Azaleapontica, geller Betfenfitanda 4 s von utelen Baricitation 12 s Berberis canadensis, canabilide Betterilge sinensis, dimellide vulgaris, gemein 8 2 Mella alba, uneiß Bürfe 3 A Betula alba, uneiß Bürfe 3 A Betula alba, uneiß Bürfe 3 A Betula alba, uneiß Bürfe 5 A Betula Be	8 8 12 20 48 6 8 2 1
Amorpha croccolanata, letranicatoger woulger sineigo 8 s fargaran anna, interiege, butterber fruticosa, firaudartiger, falider glabra, glatter glabra, glatter glabra, glatter Lawisii, Zenifens Bortion 6,4 Anagyris foctida, Efinfbaum Andromeda, 6 Soctem. jebeà Bortion 4/3 Arbutus Unedo, Eroberchaum Artostaphylos alpina (Arbutus), Wiben-Bütentraube. Bort.6,4 Uva ursi, genofinlide 6, Aristolochia altissima, bödic 20cterfume 8 x Azalea pontica, gelber Gelfenptrand 4 v von viclen Barictaten 12 s Berberis canadensis, canabilide Berberige sinensis, dünelide 5 vulgaris, genetic 8 2 ½ Betula alba, meije Birte 8 8 1 ¾ 4 4  — penu penula, fanganbe 8 1 ¾ 4	8 8 12 20 48 6 8 2 1

Forst:, Gehölz:	A A	The state of the s	A 8
allowing the unit of the state of the state of the state of	PRITTY	Bupleurum fruticosum, fitaucatt. Φαίσπόκτιείπ. Callicarpa americana, απετίταπίζα Εφήσητακότ. Bortion 8 β. Caragana arborescens (Robinia Caragana), fibirifce Ctólenbaum 35 5 Å	4
räncher: Samen.		Carpinus americanus, amerifanische Sainbuche	8
a) Wald-Camen.		C II - wife amount Wall about 6 town Wall 400 Wife 9 V	
kanntlich keinen Waldsamen ab, der nicht zuverlässig gut is e nicht nur frei von seder Beimischung sein, sondern es wir he angewandt, um ihn von leichten und tauben Körnern zurei	t, auch	Carya anna, neelec amerit. resur-over quorip-rusp 100 state 2.4 annars, offitree 1 s 8 ficiformias, feliquenformiqe 3 s - obcordata, petglivmiqe. 2 s - operation, @diseine 1 s 8 tomentosa, filique 2 s - otomentosa, filique 2 s - o	
	Pfunb	porcina, Schweins - 1 " 8" tomentosa, filgige - 2 " " Cassia marylandica, perennirende Staude	12
unne ober Fichte, beste Qualität. Dieses Jahr (1845) vorzüglich gut	8	Ceanothus americana. Reu-Berfen-Theebaum Bort. 6/3	1
is, vorz. schöner, frischer Samen	20	Celastrus scandens, windender Celastru — 6 " Celtis sspera, scharfer Zürgelbaum — 4 " — australis, australischer	5
arzfiefer, Schwarzsöhre, Pinus austriaca, von allen Kiefern ber vorzüglichste Waldbaum, sehr zu empsehlen		cordata, bergblattriger	16 12
Miefern der vorzugtichte Waltodum, fede zu emplegeen	60	Cephalanthus occidentalis, amerif. Anopiblumenstrauch	6 24
100 <b>8</b> 36 \$-	20	Siliquastrum, rothblühender 88 \$   200   2	6 20
iblattriger ober Lennen 50 v-	9 20	Clematis crispa, frausblattrige Balbrebe Bortion 8/2	24
Acer saccharinum, als Balbbaum zu empfehlen e, gewöhnliche	40	flammula, mobirichembe Bortion 8/8  viorna, fdóne Bortion 8/8  virginiana, virginifice 8/8  Viticella, roff unb blan melitre 8/8-sting 4/2	12
	10 24	virginiana, virginische	8
rige, sehr schnellwüchsige Loth 12 /3 orzüglich schöner Samen 100% 15-1/2-	3	Viticella, roff und blat melitre orientalis mografinalvifice Orientalis mografinalvifice Orientalis mografinalvifice Orientalis officentiating Colute arborescens, Blafenitrand cruental orientalis, rother media, Bafaro (bramific gelfer) Orients myselfalis, mytherolistic Stehnstrands	
Sorbus Aucuparia	8 2	Colutea arborescens, Blasenstrauch cruenta (orientalis), rother	8
nische, sehr große	16 24	— media, Baftard: (brauntich gelber) 1  Coriaria myrtifolia, myrthenblattr. Gerberstrauch 2  Coronilla coronata, gestronte Coronille 2  Portion 6 /3	16 8
	24	Emerus, Scotpionen Senne	24
er Rufter	6 3	glauca, graue Bortion 4 /8 Crataegus coccinea, großer, rothfrucht amerifanischer Dorn B 8 v	1
n Heffen, Crataegus Oxyacantha — 25 "— r:Rofe zu Heffen — ihres wohlriechenden Laubes und	5	Emerus Gotpionen-Seine Bortion 4 & Crataegus coccinea, großer, rathfrührt, ameritanische Den 78 s - crus-galli, dahnen horn 58 s - dava, großer geisberiger 78 s - lucida, glängenber 78 s - Lucida, glängenber 78 s - Cruseagus dieselberigier 78 s - Cruseagus dieselberige 78 s - Cruseagus dieselber	1
	48	Oxyacatha, Seden-Beißborn # 1 1 4 "	1 6
er, großer Dorubaum, mit großen, rothen Bee- ren als Rahrung für hochwild	8	Capressus disticus, sweigettige untitudities especification	16 8
gepege	10	horizontalis, ausgebreitete	8 16 24
nt, Cytisus Laburnum. Inderer Bäume und sugleich als Nahrung für's Wilt, weil eige bes Hohnenbaums vor allen andern gern nagt, von n. u. baherreichliches Anpflanzen zu empfehlen.	12	thyoides (Thuia sphaeroidalis), weiße Geder	12
er. Ulex europaeus, als Mahrung fur's Will	40 24	Cytisus alpinus (latifol.), reofit. Perifolatrique Bohannbaum ober Boltrogen. 23 3 4 caucasieus, caucaffider Bohannbaum ober Goldrogen. 33 3 4 caucasieus, caucaffider 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	4
b) Obfterne.	24	— caucasicus, caucațiidet Bortion 4/3 — elongatus perlangerter 8 "	
U) 27   CC   CC   CC   CC   CC   CC   CC	36 36	faleatus, fichelfrüchtiger 6 v	4
ober fuge. größten englischen Sorten	8	— hirsutus, rauher — Laburnum, gewöhnlicher — V 12,6 — nigricans, schwärzlicher — Bortion 6 "	2
20th 16 /3	100 E	purpureus, purpurfarbener 6 "	
— weiße — 10 •		- walencie walitate Rorting & C	12
re, größe rothe	24	digyna, zweistämmige	32
en, größte rothebie ftarke Bortion 8	EST.	Lotus, italienische lucida, glanzende	16 24
n. ala:	The state of	Virginiana, virginijuje	8 24
engl. Roseherry, die volltragendste und beste Erdbeere	16 L	argentea, niverplatitiget	16 28
— Wilmots superb		orientalis, bas Zinzeyd ber Berfer, mit wohlschmedenber Frucht	28
Ilpen: — 6	Date	- latifolius, breitblättriger	8
e Alpen:	Eoth	excelsior, gemeine 100% 8-4, 45 2/3	1 2
e) Maulbeer : Samen.	13	Genista anglica, englisce Ginster 2 c  — florida, iconchiscenter. — Bortion 6 c  — tinctorris, farcenter — 6 c  Gleditschia caspica hybrida, caspice Gleditschia caspica hybrida,	4
ijs Maulbeere <b>75.</b> \$\frac{1}{2}\$ rosea, rothe aigra, fchwarze. Keinfrüchtige <b>35.</b> \$\frac{1}{2}\$ rectians, Wortet's.	12 8	— tinctoria, farbender — 6 v	20
prettiana, Morett's.	16 20		16 20
orettana, Avertio.  liticaulis, vielbezweigte	201	inermis, stachellofe	12 24
oße schwarze	16 20	latisiliqua — macrocantha, größinachelige — Bortion 6,0 — monosperma, cinfamige — 6 Körner 1 <b>3</b> ,8 s — sinensis, chinesiche feinblätte — 3,2	
- fr. albo, weißiruchtigerpottion of		sinensis, chiefische feinblattr.	24
eholg: und Straucher : Samen. für Portionen notirt ift, werben diefe nach Befchaffenbeit		Gymnocladus canadensis, canadifche Guilandie	12 12
is reichlich groß gegeben. Bortion 6 &	Sil	Hibiscus syriacus, jurigier Gibidy Hippophae rhamnoides, Krujborn Hypericum Kalmianum, Ialmienbi Johanniestraudy  ### 4 ### Juglans nigra, Ballinus mit fabruager Krudet  #### 2 #	8 4
rur yortinen misse.  nan, farneside Afajic.  Bortion 6 A sais, orientalitice.  Bortion 4/3 ee, Feltaborn  Berger B	32	Hypericum Kalmianum, falmtenbl. Johannisstrauch Bort. 8 3 1lex aquifolia, Gulfe ober Stechpalme # 4 \$ 4	4
re, Felbahorn	8		3
m, gefchligtblattriger	8 8	horizontalis, horizontalzweigige 3 "	3 24
ulanum, früngestetet.  (dwarzet (dwarzet gericht getzten, von eine flattiget des, platamenblätriget ober Lennen.  ***3 9,3 hum coriaceum  schum swifet #6 6,0 rothführer #2 2½ 8,6 , gestreitet gelonensis Bestreitet gelonensis  dulosu, Griterbaum #510, kernensis  Erythrocarpa, nen.  jerghätrige Me ober Mer  caushlätrige Me ober Mer  caushlätrige Me ober Mer  caushlätrige Mer ober Mer  caushlätrige	8	- Oxycedrus, griechische	20 24
des , platanenblättriger oder Lennen= # 9 \$	1 12	Sabina, Sabebaum #2 # suecica, schwebischer Bachholber	3 6
latanus, weißer # 6 A rothblühender	8	virginiana, virginifche, rothe Ceber 2 - Kalmia angustifolia, fcmalblattrige Ralmie Bortion 8/3	2
num, Buder: # 2#8 /8	6	phoenicea, phonisifor Sahin, Sabebaum  succica, ifunctifor, Washober  virginiana, virginifor, tothe Geber  2 v Kalmia angustifolia, fomalfslätrige Salmie  Serion 8/3  Latriolia, virtifslätrige  8 « Koelreuteria paniculata, ribyentragenbe Ligustrum vuljare  Liriodendrum Fulipifera, nirginifder Tulyenbaum  10 v	8
n, tartarischer 5 & Portion 8/3	4	Liriodendrum Tulipifera, virgimijder Tulpenbaum 10 .	6
dulosa, Gotterbaum # 10 K — Erythrocarpa, neu Bortion 8/3	8	Obtusifolium, stumpfblattriger.  Lonicera tatarica, fartarifche Detentirche	12 8
rausblättrige Bretover Guer Bortion 6/3	12	Lonicera tatarica, tartarife editarife editari	2
n, gemeine Roto 10 veiße, glatte Berg : 8 1 4 8 "	2 .	Mespilus Amelanchier, ichneetvelle Misvel # 3\$	4
, gesägtblättrige Bortion 6 /3	8		
rans nana, niebriger, buffenber	20	Myrica cerifera, amerifanischer Bachestrauch, wird zur Gewinnung von Bache angebaut. 75 5 8	4 6
ra, glatter Rartian e a	8	— pensylvanica, immergrünet Paliurus aculeatus, Chriftusborn Phillyraea angustifolia, schmalblattrige Steinlinde	8
la, Stinfbaum.	12	— latifolia, breitblattrige — - 4 "	
Io, Erbbeerbaum	20	latifolia, breifblüttrige 4 - 4 - 4 - 1008 45 14 28 s   4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4	8 8
oclanata, fairanfarbiger wolliger Inbigo — 8 " rans nana, niebriger, wiftenber cosa, firandpartiger, faither ra, glaiter sisi, Zewie'sne — Bortion 6,6 da, Einfbaum — Scoten — İsbe'a Bortion 4,6 fo. ferbeterbaum — İsbe'a Bortion 4,6 ira ursi, gemönniche — 6" ira ursi, gemönniche — 8 " itssima, bechfe Scherchume — 8 " g, giber Be'lenitranch — 4 " cu Barichiten — 12 " tensis, canabific Berbertige sisi, chinelitide — 22 X	210	austriaca, Schwarzionre voet Schwarziteiet, von auen	8
1, gelber Felsenstrauch - 8 m	48	Riefern ber vorzügl. Balbbaum, fehr zu empfehlen 2 3 4 Balsamea, Balfam-Tanne Rartion 2 2	8
densis, canabifche Berberige	6		48
asis, geneine	2	Camba Helalita Olabelandlista ma 4 4 17	10
endula, hangende	1 10	- Douglasii, Douglafens Bapfen 2 , - ,	12
36fe ameritanische "getrage ameritanische "Boction 6,6 talpa ober Catalpa syringaefolia, Etompetenklinmenkaum. "Se 28. Paras, fchartachrother "Boction 8,3	10	Hamiltonii (Tenore), Samiltons. Sortion 1 #8/2	1
	16	T . O	280

	Sot\$
inus microcarpa, rothe ameritanische Lerche	B
mitis, weiche Kiefer — 12 " Mugho var:	12
nigra, schwarze canadische Fichte	10
Pallasiana (taurica), Pallas-Riefer	12
Picea, Silber: ober Ebeltanne, Diefes Jahr feine Erndte.	
Pinea, Steinfiefer # 64 - 3	6
Pumilio (montana), Mugho: ober Berg: "2" — "  — pyrenaica, pyrenaifthe	2
resinosa, barriae 5 - 8 "	
rigida, (thatfe	
serotina, thate	
Strobus, Beymouths: #3 \$ 12 "	3
sylvestris, gemeine Riefer, ertra schoner Samen " 1 " 4 " argentea (Tenore), silberartig 3 Bapfen 1 " 4 "	
— Taeda, Beihrauchs: 5 — - " 10 "]	
variabilis, veranderliche 5 — " 8 "   Pistacia Terebinthus, Therebinthenbaum Portion 8 "	
vera, echte Bistacie 10 Körner 8 "	
	4
rings glabra glatte Winterhaus Wantiem e	
runus lusitanica, portugicifice Corbere — 6 « — mahaleb, duftende Traubenfüriche — B 4 ½ — « — Padus, Arauben-Kiriche — "2 « 8 «	4
Padus, Tranben-Rirfche 2 " 8 "	2
virginiana, virginische Bogelsirsche	2
yrus Aria, Mehlbeerbaum	4
- communis, Birnferne 2 v 4 v	2
— edulis, eßbare Azarolbirne	4 2
- torminalis, Elzbeere " 3 " - "	4
thamnus Alaternus , breiblattriger , immergruner Begeborn	
## Alpinus, Alpen = ## Bortion 4 /3   ## Bortion 4 /3   ## 6   ##	28
eatharticus, Kaulbaum # 3 K	3
- latifolius, breitblattriger Bortion 6 3	170
thododendron catabiense, schönegroßbl. Alpenrose 6	
- hybrid. fcone Baftarb : 6 "	
arbor. schöne baumartige — 6 " ferrugineum, roftblatte, reiner Samen — 6 "	80
hirsutum, haarige, reiner Samen 6 "	80
maximum, großte, 6 •	80
arboreum, pont, baumartige — 6 "	40
arboreum, pont. baumartige	
Rhus elegans, schoner Sumach	
glabra, glatter	4
typhina, Hirschfolben: Vernix, Firniß:	14
Ribes sanguineum, fcone, rothblühende Johannisbeere Robinia Altagana, Altagana-Afazie Bortion 12/3	16 12
Robinia Altagana, Altagana-Afagie Bortion 12/3	200
- angustifolia, fcmalblattrige. Caragana (Caragana arborescens), Ethfenbaum. #5.4	12
dubia, Dubiote flebrige Afagie	20
Pseudacacia, gewöhnliche, weißblühende # 12/8.	2
spectabilis, quiebulide	24
- tortuosa maxima, größte hängende. Bortion 12/0 viscosa alba, weiße flebrige. 12 "	
losa canina, wilde Muie	2
capreolata, ranfende palustris, Sunuf:	. 8
pimpinellifolia fl. pl., gefüllte pimpinellblattrige	6
- rubiginosa, Sweetbriar: # 3.Kl	3
villosa, echte Sagebutten # 6 v Sambucus nigra, gemeiner Sossunder # 2 v	5
- racemosa, Trauben: " 4 "	2 4
onhars innanies, gelbe Saphars aber Afric	090
orbus Aucuparia, Bogelbeere #8 S/3 — domestica, Spierlingsbaum # 3\$- — hybrida, Bastarb-Bogelbeere.	12
domestica, Spierlingsbaum " 3#	3
Spartium junceum, franische, schönblühende Pfrieme.	6
linifolium (Genista linifolia) Rartian & A	12
multillorum, weißblühende 6 v	270
- congrism Beforefriams 24 9/0	2
piraca sorbicila, vogelecetélátt, Spierfaude.  taphylea pinata, Pimerniÿ.  ### 3 ###  stereulea platanifolia, volatanensláttrige Stereulie.  #### Sover  #### Sover  ###################################	8
sterculea platanifolia, platanenblattrige Sterculie Rortion 6 4	4
Styrax officinalis, Storax	24
Symphoricarpos racemosus, amerifanifche Schneebeere.	6 2
yringa vulgaris, gewöhnliche weiße und violette Sprene # 1 & 4 /3 faxus baccata, Taxus- oder Gibenbaum # 3 &	3
- canadensis, candolider	4
- hibernica, bunfelgrüner irlanbifcher 100.Rörner 135.	28
- nepalensis, nepaulicher Bortion 12 /3 occidentalis, abendlandischer Bock	
occidentalis, abendlandischer 76 6 78 6 78 6 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79	4
orientalis, mergenlánbifder 9 12 % nana, nichrigare morgenlánbifder Bortion 12 % sphaeroidalis, breije Geber tataries, tartariides Eefenebaum filia europaea, genöfinlife Einbe 7 1 ½ 8% llex europaeas, Catafelignifter 7 2 8 8 % Jhaus fulva, größtättt, amerilan. Unne 8 3 8 7 % iburnam dentatum, gegöntette Edmeeball Bortion 4 % Lantana, wolliger. 7 2 ½ Opulum, gemeinet .	8
sphaeroidalis, weiße Geber	12
Filia europaea, gewöhnliche Linde 97 1 N 84	32
Ilex europaeus, Stachelginfter 2 u 8 n	2 2
Viburnum dentatum, gezahnten Gehnashall	3
Lantana, wolliger # 2.K	2
Opulum, gemeiner " 2 " prunifolium, pflaumenblättriger Bortion 12/3 Virgilia luten, gelbblättrige Birgilie Bortion 12/3	2
Virgilia lutea, gelbblättrige Rirgilie Rortion 126	8
Vitex Agnus-eastus, Reufcheitebaum	12
incisa, eingeschnittenblättr Bortion 8 B	283
nieisa, cingefenitiemblaite Bertien 8/3 kisyphas oxycarpus, mebrfandige Consbaum — 6" sinensis, chinflider — 6" vulgaris (sativa), geneiner — 78 8/5. Bon vorlebenben unb fontigen bier nieds anaeführten 68-chis	168 168
vulgaris (sativa), gemeiner 78 8 1/4	6
Bon vorstehenben und fonstigen bier nicht angeführten Beholg	= unb
Straucher-Samen konnen Sortimente nach unierer Wahl abgegeben w	erden:
100 Sorten für 40-1/2	
25 - 10 market 125 - 10 market	

25 - " 10 " Bei Bestellungen beliebe man zu bemerken, ob Camen von ichonbinben-ben Stänichern, ober baumartigem Gehölze u. bgl. mehr, vorzugsweise ge-wänsche wecken

## Amerikanische Gehölje und Straucher : Camen.

Siervon erhalten wir jahrlich im Fruhjahr birecte Genbungen aus Rordamerifa, woruber, wenn fie frubjeftig genug eintreffen, um fie meiter verfenden ju tonnen, ein besonderes Bergeichnig erfcheinen wird.

## 12) Erotifcher Camen.

Wir erhalten alljäcklich Samen Sammlungen aus vielen Weltgegen-ben, die zu gang unbestimmter Zeit eintreffen und worüber erft bann Aner-bictungen gemacht werben tonnen. Wir bitten die darauf Restectirenden, und gefälligft ihre Wansche mitzutheilen.

13) 3 lumen = Oamen.

und geringen Ansehend zu billigen Preifen erlaffen. Auch von biverfen fconen neuen haben wir Borrath; feboch nicht groß genug, um ihn allgemein zu vertheilen, wenn nicht einen bei winzigen Bortionen und gu hoben Preisen, was wir aus guten Grunden vermeiben. Eben baber find auch bie bier verzeichneten neueren Sorten burch billigen Anfan Jedem juganglich gemacht. trander: Samen. Getheilte ober halbe Portionen fonnen nicht abgegeben werben. Bon nachstehenden Blumensamereien erlaffen wir nach unferer Abmahl: Gartenblumen. Stockrofen oder Malben,
ment von 20 verschieben Farben der hohen gefällten Ma .. 15.4 — \beta
.. 6 " — "
.. 3 " 12 "
.. 2 " 4 " 307 Ein Sortiment von 20 verschiedenen Farben der hohen gefällten Mattern mit Vanen.

für \$\frac{1}{2}\times \frac{1}{2}\times \frac{1}{2} Feine Gartenblumen, die erft im Mittbete ober in Abpfen angegogen, und fpdter in's freie Sand gegtlangt werben.

100 febr foone Gorten mit Ramen für. 15.4 – 5.50 1900 a en Sorten. 24 N. Alpemakkeid.

canadifde. foden.

afteritige. Goden.

afteritige.

berndicklige.

berndicklige.

ferndicklige.

gemöhnliche. 2019. 28 d.

gemöhnliche. 10 teilen. Barben. Both 66.

metgelichgender Stadytlimohn. — 16.

Barclaufs.

No. 283.

28 Sort. gef. Burcraftern. f. No. 288.

tleine. sarte. Bellichaue. Both 160.

tleistliche. purpurrofte Alpemblemungs

zothölispende.

fleistliche. purpurrofte Alpemblemungs

zothölispende.

fleistliche. purpurrofte Alpemblemungs

zothölispende. Perennirende-Standen-Samen. striata.....viridiflora... Größtblühendes Stiefmutterchen, Topfgewächs: und Topfblumen : Camen. englisches Heartsease (Pensée), Viola tricolor maxima. Rach unferer Auswahl. Eine ausgezeichnete elerde der Earten, so wie im Topfen auf Blummenftellager fann zu Einschlungen nichts Schneres empfohlen werden.

317 30 fepartal gefammelte, prochroule garben in 30 Portionen, die wieder gegen 100 Bartellten liefern Bannen in 30 Portionen, die wieder gegen 100 Bartellten liefern Bannen für 4. I.

318 Cine Wielange unfers gannen, aus mehr als taufen Kartellten beiter henden Sorttments, eine zosie Portion.

319 Desgleichen eine Keinere Portion. 50 Sorten schöner Topfblumensamen, die größtentheils als 1 und Lächrig schon im ersten Sommer blüben. " für 8 L. — " für 4 und 2 ... — " für 4 und 2 ... nana f. pl.
yaramidalis.
401 "tancilus.
402 Asclepias amoena
103 incarnata.
404 syriaca.
405 Astragalus alopecuroides.
406 m a x in u s.
407 Baptisia exaltata.
408 Barton in a u re a.
409 Beta Cicla brasiliensis. 50 fcone Sorten wirklich ftrauchartiger und perennirender Topfpfl für 15 % .... für 9 und 4 ... Lupinen rachen größter. Both 20 de.
hobe Baptiffe. Both 20 de.
neue, schone, goldzelbe Bartonie.
fchoner Wangold, mit gelde, vorise,
rothe und sonftig ichon gendereien.
Scholze Blättern. Soff 12 de.
Blättern. Somfiehe Rr. 832 u. f. w. Sortiment von 50, incl. viele ber vorzüglich iconen neuen, größten theils perennirenden Sorten und Barietaten in 50 Portionen. n Sortiment von 40 gang neuen prachtvollen perennirenden, die durch Befruchtung der Saupsforten mit ein-ander, gewonnen — (wie zielfen davon Blumenrispen von über 3 füg Ednge und von schönfter Zeichung.) — Diese 40 Bartet. 8.X 410 Brachycome iberidi-folia...... Levfojen : Camen, gang vorzüglich in's Gefüllte folagenb. Commerlevfojen, Pracht: Calcevlarien, 412 — fol. rubris var...... 413 Briza maxima ..... Cheiranthus annuus.
(Mathiola annua.) Calcolaria hybrida.

(Diefe berrites Sierpfany, in der Sitte wie ausglechnder Samen binnt mit Roch emrofden zu werden.)

21 10 Portionen, ohne nähere Stepidenuna.

Diefer Samen it som den ausgeprodereiten neueren Sorten gewigten zu der Stepiden zu der St 114 minor...
115 graciiis
116 Browalia elata fl.alho...
117 fl. coeruleo...
118 Cacalia coccinea (Emilia).
119 fl. luteo...
120 Calampelis scaber (Eceremocarpus scaber)..... Eine große Portion von fehr vielen Sorten melist, extra.... ber die Ausfaat und fernere Kultur wird Ausführlicheres bem Si Sahnenfamm, elosia cristata. 121 — punic 122 Calandrina compressa... 123 — grandiflora...... 124 — \*speciosa....... 125 Calceolaria hybrida..... Serbstlevkojen,
ober spatbluhende Sommerlevkojen.
288 An Sortiment von 12 verfchiebenen, extra fohinen Ablahrennagen mit Ramen fri.
28 4 8 6 289 Diese Sorten melitt. ... eine große Portion 12 8, Liedes Portion 360 Reue per petuelle ober mehrmals bildnehe. Kaifer-dereige violett carmoifinrothe ... Souftige Sortimente. ...... für 2 X - /3 azurea.....
\* carpatica...
corymbosa...
crenata....
e x i m i a ...
glomerata... carpatifiés 80 m tauthen files 90 m tauthen filesipse. 16 m tauthen filesipse. Winterlevfojen, Cheiranthus incanus.
(Mathiola incana.) (Mathiola in can a.)
262 Ein Sortiment von 12 dee fischillen Udscherungen mit Namen für 2 L 8 s.
263 Olefe Sorten meliet, eine große Portion.
264 Desjelichen, Kleinere Portion.
265 Ate Lauslität oder fest gut in Schillte fischagende Winterterbojen, in
266 Ate Lauslität oder jest meliet der Schillte fischagende Winterterbojen, in
266 Ate Lauslität oder gem Drittheil im Gefüllte fischagende Winterterbojen, in
266 Ate Lauslität oder gem Drittheil im Gefüllte fischagende Winterterbojen,
267 Aus der Baumleben geführe fischen violette
268 Ausmeleben oder Baumleben, fischen violette
269 Pyramiden oder Baumleben, fischen violette
269 Ausmeleben oder Ausmeleben gestellt glomerata... grandiflora.. Grossekii.... Loreyi..... macrantha... macrantha...

Medium...

fl. pl. coeruleo...

lilaceo...

Die vorstehenden 3 Sortr
pendula...

O Bu Ginfaffungen. . Both 24/3 Pentagonia .....

Pulch errima
pyramidalis .....

fi albo...

Scheuchzeri..... ... Both 20/3 Goldlack, Cheiranthus Cheiri. Cheiranthus Cheiri.

272 Gefüllter, extra großichbenber, bunfelbraumer, höher Stangen-Sad,
verziglich feden
273 de renner, foher höheld.
274 enner, bunfelbauer, ette föden
275 großiumiger, bunfelbraumer, niebriger ober Ziwerge276 (in fa des., großiubenber, bunfelbraumer Stangen-Sad
277 großiufiger, bunfelbraumer Stangen-Sad
278 bunfelbfauer, föden
279 bieletter.
279 großlichenber, bunfelbraumer, niebriger ober Ziwerg280 großlichenber, bunfelbraumer, niebriger ober Ziwerg281 felt früßlichbenber, fleiner, bligelber, dießleg.
282 Obige 10 Sorten à 1 Portion. Erflarung ber Beiden. gete ben gering gete greek gering gete greek gering einjahrige Blumen ober folche bie im erften Commer bluben im Garten ausgefaet werben. im Garten ausgestet werden:
einischige der Gemmeelbumm, die aber erft in Mildbete ober Töpfe gesa
und nicht vor Wal in dem Garten gepfangt werden,
sprichtigte gere erft im protten Aahre blührne,
peremntende ober ausdauernde Stanbengroddife,
peremntende, die aber erft in Zopfe in Mildbetten gestief und halter
pfangt werden. 171 474 Can Relch: ober Mohr: Mftern, Aster chinensis fl. pl. 288 Ein Sortiment von 24 der fohnten englischen, erten gefüllen ühren, in 24 Ababreungen mit Ramer. für 3 L 4 5.
294 Ein Gortiment von 12 Sorten. 12 1. 12 2.
295 Angegeber horten von 30 Sorten melitt. 8.6 und 295 Aleiners Portion. 8.6 und 30 Sorten melitt. 8.6 und 295 Aleiners Portion. 295 Sorten seine gefüllte Aleen in allen Barben melitt. 501 1. L 286 Sefällte, niederige oder Worsen generalter, 12 der schonlung Sorten seine Sorten melitt. 12 2. 4 6 3.
290 Och die gefällte Augelenkflex, Sowich Sorten für 1. L 2. 2.
290 Soch aus Pyramiben Alber, fehr problemd und blumenrich, of gleich diese nieder gefällt fürd, wiele Arter melitt. Soch 25. 350
351 -- \*coeli rosa.
352 -- flos jovis...
353 Agrostis pulchella( Relfen. Dianthus Caryophyllus. 293 Ausgezeichnete Gortimentonelken von einigen hundert Namenforten bes ersten Ranges gefammelt und als ganz vorzäglich zu empfehlen 190 Körner 2 L —  $\beta$ Nice Gertien meilet.

Carthamus tintedrius.

Galier.

Baßletkume, blaur.

16 - Belover.

Baßletkume, blaur.

16 - Belover.

Celosia cristata Gotto, Dahmenamm, vorsäglich föherer, als:

5071 phosimientof 5 - 5691 goldpath 5 5699 purpur - 5491 ghamois
5411 gelb banachirt - 5121 rola - 513) fitroheith - 514) verilibert

rola - 515 violett - 516 damanamh - 517 reurfarben - 5487 pratumein, bedmacht - 5130 distilliber - 5269 rothbildtinger

alti physimien - 5227 profarbiger - ibre Gerte 506. 46 gh.

Celosia cristata un an a... Gotte carmelinesförer, prädtiger Surerg...

36 da gange Gertiment von 16 Gerten. Sochmuth oder Ritterfporn, 299 Gin Sertiment von 12 verfchiedenen Barben mit Ramen, gefüllter niebriger eber Boerg , Dolph, Ajacis ff. pl. för 20 fc.
300 Alle Farben mellit.
300 Alle Farben mellit.
302 Derfilbt, alle Farben meilit.
302 Derfilbt, alle Farben meilit.
303 Gin Sertiment von 4 gf. doben, Höb sweigender Mitterholm 12 v.
304 Gin Sertiment von 4 gf. doben, Höb sweigender Mitterholm 12 v.
305 Gin Sertiment von 4 gf. doben, Höb sweigender Mitterholm 12 v.
306 Gin Sertiment von 4 gf. 200 der Sertiment von 4 gf. 12 v.
305 Gin Sertiment von 4 gf. 200 der Sertiment von 4 gf. 12 v.
305 Gin Sertiment von 4 gf. 200 der Sertiment von 4 gf. 12 v.
305 Gin Sertiment von 4 gf. 300 der Sertiment von 4 gf. 12 v.
305 Gin Sertiment von 4 gf. 300 der Sert 374 Anemone. coro nr ia
375 Anemone. coro nr ia
375 — multiflora ... 7,
375 — multiflora ... 7,
376 — Polestifla. ... 7,
377 Andra Dillesiana ... 7,
378 Anomatheca cruenta ... 7,
378 Anomatheca cruenta ... 7,
379 Anthemis purpurascens ⊙
379 Anthemis purpurascens ⊙
379 Anthemis purpurascens ⊙
378 Anomatheca ... 36 S88 Balfaminen, Impatiens Balsamina. 306 Ein Sortiment von 20 der fconften, ertra gefüllten, incl. Camellien-, Wofen-, Bwerg- und Zwerg - Camellien- Balfaminen, für 2.\$8 f. No. 733 u. folg.

nulizaR	Portion 1		Portion	Caltroll	Portion.
339 Chelone barbata	4 672 G	umaria sempervirens	öner Erbrauch Loth 12 /3 /2 unnige Galarbie 24 // 2 efarbige 24 // 2	819 Lisianth us Russelianus ot 820 Lobelia cardinalis2	Rardinals-Lobelie 4
543 Chrysanthemum earinatum breifarbige Bucherblume	Soth 8/3 2 674 — — 12 " 2 675 —	— picta	hatte, ausgezeichnet icon 4 harbfon's Loth 24 & 2	821 — Erinus	fcmalftielige, febr hubsch Loth 60 & 3
544 — coronarium	(emenien 4 677 G		fische Geistaute	824 — syphilitica21 825 Loasa aurantiaca (Cajophora	ausgezeichnet schon
549 Cistus ladaniferus fcone Ciftrofe	4	Sortiments gefanmel	t. wovon in der Regel feben 2te und	826 — tricolor	prachtige, orangegelbe Schlingpflange. 3 breifarbige Loafe
551 — rosea	3 679 -	eum atrosangnineum 21 bi	e Georgine liefert	828 Lophospermum ernbescens. 7	errothende Kammsamenpflanze, ein prächtiges, klimmendes Tontgemächs
553 — *pulchella	eoth 20 \( \beta \) 2 \( \beta \) 681 \( -\beta \) 20 \( \mu \) 2 \( \beta \) 682 \( -\beta \) 20 \( \mu \) 2 \( \beta \) 682 \( -\beta \)	-chiloense (Quellyon) 24 5ii	nnoberrothe, febr fcone	829 Lotus Jacobaeus	auch für den Garten 4
555 fl. albo	9 684 - 685 -	— fl. albo to	aue, kopfförmige Gilie Loth 10 ß 2 eißblähende	831 Lunaria rediviva	walliger 4 violette Mondviole Coth 12/2 2 weiße Eupine 2 " 2
Die Clarkien gehören zu den iconften ber Sommerblum gieren auch in Topfen.	en, und 687 –	- tricolor	eifarbige, febr foon	833 — angustifolius. • • 834 — arboreus. 24 835 — a r b u s t u s	baumartige, weiß, blau u. gelb melirt 4 ausgezeichnet zierlich , fehr vollblühend
558 Cleome pentaphylla	4 690 6	Glaucium luteum	uchtenbe, fcon	836 — bicolor	und schön, pr. Korn 12 % sweifarbige
561 Cobaea scandens Flimmende Cobae, auch fur's einer Mauer ober Plante, 100 Ror	Breie, an 692 -	— violaceum (Römeria). ⊙ vi	oletter, fehr fcon 20 2	838 — elegans	phyllus) 21, neue, febr großblöttrige
562 Coik Lacryma	fehr zu 696	- fl. purp@tw pr	ifchfarbiger	840 hybridus2	buntelpurpurne, fehr foon, Both 12 /2 großblattrige 10 gang neue pract. Barietaten in 10 Portionen fur 2 3
264 — *grandiflora	- 16 " 2 698 - 16 " 2 699 6 700 -	odetia lepida 6 hū	Soth 28	841 — Hartwegii	uberaus practic und ausasseichnet in
565 Collomia coccinea. O hodrothe Collomie. Grandiflora. O großblühende. Gharladrother Blafenstrauch.	- 8 " 2 701 - 702 G	- vinosa • ro	thgeaderte 20 ,, 3 te Baumwollenpflanze 2	844 — lepidus21 846 — littoralis21	febr bubiche, 1/2 Tus boch, aus Columbien. 6 hellrothe Bach-, aus Columbien. 4
568 grandiflorum prachtiger greeßblub, scharlach 569 Commelina coelestis 21 himmelblaue Commeline, schö 570 Convolv purpur (Iromoga) hochransenbe Winde, in vielen	103	rypsopuna aitissima	dies Sobstrant	847 — lacidus24 848 — luteus	buntelgelbe Both 26
571 — tricolor	8oth 6 6 2 707 1 - 6 2 708 1	Hedysarum coronarium	ines	849 — leucantha   850 — Marshallianus   2	mit weißem Samen
(fur andere Gorten fiehe Ipomoca.) 578 Corcopsis Atkinsoniana2  vielbluhende, gelbe Corcopfis	709 1	Helianthus annuus fl. pl g	fullte Sonnenblume, buntel = und fcmefelgelb 2	here, menn aus G	ap. Marshall. verlieren fich wieder in an Samen gezogen. Der obige ift von einigen nnen, wovon wenige einander gleich waren,
574 — Drummondii (basalis) (picta) • temalte, prachtvolle 575 — tinctoria (Calliopsis	- 12 " 2 711 7 712 1	Heliophila arabioides for Heliotropium peruvianumt	oloffale 6 " 2 hone, blaue Sonnenliebe 3 kliotrop. 4	851 - Marshallianus	seconet hublo.
bicolor) Doppelitern, od. d. fight for atrosanguinea. Doppelitern, od. d. bluttoth, feht for atrosanguinea. Doppelitern, od. d. bluttoth, feht for atrosalih annial Doppelitern, od. d. bluttoth, feht for atrosalih annial Doppelitern, od. d. bluttoth, arabifuhende.	n- 12 " 2 714 1	Heracleum giganteum4	roßblühender blauer	853 — micranthus @ 854 — Milleri 24	Dilleriche, viele Bariet, melirt
578 Cosmanthus fim briatus allerftebste Commergewiche. 579 Cosmus bipinnatus	8t. 48 3 3 715 1	- tristis	dutterviole, diverfe Farben, Loth 8 & 2 ohlriechenbe Nachtviole	Die nämliche Bemerkt	12 gang neue Bariet., fehr icon, 2 \$ 8/5 ing. die bei Ro. 850, gilt auch hier. veränderliche, fehr wohlriechende, wegen
581 Crepis rabra	2 719	esculentus	Barer 3	ihres fconen, 5 Bus	hoben Buchfes und üppigen Blühens bis ils Bierde bes Gartens Loth 8/2 Eruleshantsische 8 "
584 Cucumis fle xuosus Schlangen-Melone	5 4 722 -	militaris	oßer, gelber 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	gang ber mutabil	is ähnlich, aber buntler und noch fconer.
586 große Portion mellet. 587 leucantha, ganz neus Zier-Kürbis mit großen Blüthen, farkfletternd, und besonders	, weißen 725 1	Trionum	Runden — 6 " 2 bone Humee. — 96 " 4 brauchtlättrige Dannemannie	859 — nootkatensis	fehr schön
Declung von Wänden, Lauben z., 4 Sort 588 — biefelben gemifch. 588 Cuphea viscosissima	ten16/3 728 1			861 — perennis	große, rothe 4 " 2
590 - silenoides prachtige	6 732	"umbeliata superba@ pi	enorifde	863 — polyphyllus 24, schöne, 28 guß Lange, in viete 864 — albistorus24	trägt herrliche, blaue Blumenbolben von n Ruancen
591 Cyclanthera pedata ranfende Epclanthera ost Space (Space Space) sam limifolium ost sieniolis, biothes George (Space) sam Regico, 100 Körner 8/3, a	rgine aus 20 K. 3/5	gangen Gortiment	egemifcht	865 — lacticolor 2 866 — paniculata 2 867 — striata 2	neu und febr foon 4 neue, himmelblaue, foon 4 weiß mit blauen Streifen 4
and the second s	Both 24/3 2	Farben	, in 6 ber fconften Gorten für 1 1 8/3		metirt
*Delphinium Ajacis-nana in iedriger, gefüllter Rittersporn ob. 4 in 12 Karben, fiebe Rr. 299.	- 56 " 4 736 737	- Rofen Balfamine	gemifot. 6 6 6 6	871 — rivularis	abrenblutbige Both 203
Ajacis elata ( ) hochmachfender Rittersporn in 6 ( ) fiehe Rr. 301.	739	- piele garben egal	punktirte, 6 fconfte Gorten, 1 & 8 A gemifcht 4	873 — succulentus	wollige, viele fcone Barietaten melirt
598 azureum	Mr. 303. 4 741	- 1 Gortiment von 20 ver	gemifcht 6 fcbiebenen, worunter einige aus jeder ungen für 2 8 8/3	875 — 12 schone separirti 876 — tristis	Barietäten
600 — crassifolium (speciosum) 21. ichoner	50n 4 742	glanduligera⊙ i	Riefen Balfamine, 8 Fuß hoch,	dro versionler 21	verfcbiebenfarbige, fcon
608 exaltatum. 4 ers feld general feld gener	- 16 " 2 - 20 " 2 748	- acomis alba 💿 8	ebenen neuen Riefenbalfaminen 4 lief en balfamine aus Indien 8 inef. Incarbillie, fehr foon 6	880 — fl. albo et carneo 881 — *corsica	
606 — intermedium2 mittlerer	746 1	innia glabra	atte Inula Poth 16 & 2	esq I reopersieum esculentum	Liebesapfel, großer, rother — 884 birm- tirfchformiger — 886 fleiner, runder — in Both 12 fd 2
608 — pubescens. A wolliger. 609 — sibiricum. & großel. hummelblauer. 610 — tristis. & travernber, hübsch, auch für T	opfe 6 749	coccinea(•)	eißblättrige	888 Diefe 5 Gorten melirt ober fe 889 Madia elegans	parat 12 " 2   fone Madie 12 " 2
611 — 1 Sortiment von 12 iconen Sorten peren. Rittersporn 612 — viele Sorten melirt	oth 12 2 751 rften und 752	hederacea	pheuartige, behaarte 4 berkrautblättrige 4 elblichblüchende 4	890 Malope grandiflora	meifie
fonstigen Ranges, siebe Nr. 283 643 — atropurpureus 2 bunkelrothe, gefüllte, prächtig. 614 — barbatus	6 754	— Nil	hone hellblaue 4	1 egg trifide	breitheilige, fchone Soth 40 3 9
615 — fl. pl. gefüllte. 617 — *chinensis. • gefüllte farb., auch be-	oth 20 % 2 758	— - rubro-coer. ⊚ two	ochrankende, in vielen Farben Eth. 6 ß 2 oth purpurne, extra fcon, 100Kr. 8 " efiedertblättrige, hochrothe, febr fcon	896 — striata 896 — miniata	mauritifde Maibe 6 " 2 gebra gefteiffte Maibe, 4 m. febr fone, außerft gierlide Malve, t Bleinen, bunkelorangenen Bluthen, bunt
618 — fl. pl. albo @ gefüllte bo	3 759	tricolor	100 Körner 20 ß 4 reifarbige, hochrautende. 4 reilappige, schöne weiße	897 — moschata21	Mofdus-Malve, roth u. weiß, Lth. 83
cos Jelsoides 21 Mornello	- 12 11 2 101	— versicolor violacea •	- verschiedenfarbige 4 - violette 4 vrachtige azurblaue, merican 2 Rr. 16 &	899 for mosa (fragrans) 900 Matricaria Parthenium 24	tw Elephantenruffel
622 — Fjaueus. I grave, weiß mit roth. 623 — hybri dus I. Knight's new Nelke — eine prachfebriev vonDianth dard. a latifolius, u Einfaftungen nichts 624 — latifolius. I. breitbilktrige, föön. A		- 12 fcone Arten und Gort	n	901 Maurandia Barclayana 5 902 — Lace yana	Laceys neue, foone, rothe 6 timmerblübenbe 3 mers duch für den Garten.
625 — "plumarius	- 8 " 2 766 	elegans	blühende, äftige Ipomopfis	004 Masamberranthamum	PROPERTY Property of the Company of
628 — bicornuta 4 zweihörniger, neu	- 41 " Z	Kaulfussia amelloides (Charieis heterophyll.)() fo	one, blaue Kaulfußie	1906 tricolor	m glatte Baferblume
631 — grandiflora	8oth 20   2   770   771	— Comptoniana	ompton'fde, purpurrothe 4 atte, febr fcon 6	S Comercial Commercial and Princip	fcamhafte Sinnpflanze od. Rührmichs nichtan
	- 12 7 2 772 1 - 32 " 4 773 1	actuca perennis2 51	hr fone Blafentetmie Both 20 /3 2 auer perennirenber Galat 20 , 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		m. Carbinals - Gaukler ober Affenblume icharlachrothe, fehr ichon, blübt ichon im ersten Zahre; mehrere Farbennuancen
Bohnen	of 4 776 -	glabrata 🕙 gel	be Capthenie, aus Californ.— 12 " 2 itte — 12 " 2	909 — Groomii	Groom's schone. 3 gelbe. 2 wrose gelbe. 80th 20.3
638 grandislorum 24 großbl., prächtig blau	8oth 4 /2 2 778 -	— Clymenum m	rächtige Wide. 4, 2 auritische. 4, 2 eithlättrige. 12, 2	911 — luteus	neuefte Practforten melirt
641 — Ruyschiana	781 - 782 -	- magellanicus &	eitblättrige	914 — quinquevulnerus   915 — rivularis   916 — roseus superbus   2	fünffledige, fcone 2 Bad-Affenblume, fcon. 2 pruchtige, rofenrothe.
649 Echinops exaltatus. 2. höchfter Rugelbiftel	8 # 2 784 -	besgl. rothe - 785 we	ohlriech Platterbse ob. Wide in allen Farben	917 — variegatus	Smith's, febr fcon
645 — lucidum • glans, goldgelde Immorreue. 646 — fl. albo • weiße	20 " 2 791 -	purpurne — 788 fcmargo weißen Streifen — 790	arpurne — 789 fcmarzeurpurne mit cothe mit weißen Streifen, jede, Lt.6,6 % lbblühende Erbfe	Die Mimulus Arten fi blumen zu empfehle	nd als practivolle, fowohl Garten= als Topf=
648 — macranthum	- eine 792 - 793 - 793 - 794 -			920 Mirabilis hybrīda© 921 — Jalapa	fconbl., in verschiedenen Farben 2t.8/3 2
verfciebenen Ru ancen und Größen,eine ftarte melirt	Portion 795 I		nollige	933 — longinora	ha mialette in mehreren Miancen ichan
(3wifden E. robustum und E. macranthum).	me, mit 798 -	salvitellensis	beiartige	927 Molucella laevis© 928 — spinosa©	orftehenden für 16/3 gatterArichterkeich Coth 24 g flückeiger bo. 3 großen Guther Schlen Greichte Geben 3 geben Guther Geben 4
2 Zolf großen Blumen — die wir d Samen vom Schvanenslusse erzeu blübt erst im zweiten Sommer fl.Kr	1839 aus 11gten — 800	densiflorus bidt: Ruancen von weiß und iill	der, lilla und weißer Farbe	930 — Charantia	Min Baltamsware . Soctssyl
651 Erigeron glabellum	bient als	Beibe vorftebenbe find allerliebft.	e, gierende Gommerblumen.	933 floribunda	blumenreiche, fehr ju empfehlen, für Topfe, wie für ben Garten 3
655 Eryngium planum	oth 12 & 2 802 I	ilium superbum	olge Lilie	934 Nemophila aurita © 935 — *atomaria © 936 — pedunculata ©	geontte, violette Liebeshainblume 4 fein punktirte, weiße, allerliebst, Both 8.6 gleinbluthige, weiße
656 Erysimum Perotskianum	orange 805 I	fl. luteo	lbes	937 — insignis © Sommerblumen, b. herrlid 938 — major ©	fein punktitrte, weiße, aller liebst, Both 8,2 g Fleinblichige, weiße. 8 2 prachtvolle, als eine ber lieblichften her. blauer Karbe, febr zu empfeblen Botht 12,6 wie vorstehende, nur größer von Bla-
658 — compacta2. bunkelgelbe, gebrungene	- 16 " 2 808 - - 20 " 3 809 -	- latifolia bi	reithlättriges	939 — phacelioides	then Enth 12 Gt a
66f Espatorium purpureum	pentraut 4 812 -		edliches Leinkrauf Sother   50   20   20   20   20   20   20   20	A STATE OF THE STA	Control of the second of the s
664 viscida practiolle, befonders fcon	e, blaue 2 815 -	grandiflorum	seißblühender frauchartiger eine au-	942 — longifolia © 943 — macrophylla © 944 — n a n a ©	Ne febr langblutbiger   4   1   1   1   1   1   1   1   1   1
666 Fedis Cornecopiae	3	pflanzen in di	Lopfpflanze, die fich auch jum Aus-	nyctaginiflora fiehe Pett 946 — sanguinea	inia. m fconer, blutrother
669 — sonchifolia	3 817 -	perenne	mmermafrender Both 8/8 2	A Passi feld and more man	grap That under Mereckerik von Uich

Bortion